


INJECTION Acelowan




Aceclofenac (BP)



ہر قسم کے درد کیلئے

پھوؤں اور جوڑوں کے
درد سے نجات پائیے

آرام اور سکون کا دوسرا نام



 NAWAN
LABORATORIES (PVT.) LTD.



پرانے دنوں میں درد کا علاج چینیگل پیپتاڑوں کی سوٹی اور میکوگی کی کم سے کیا جاتا تھا مگر مسلسل استعمال کی وجہ سے اسادیت کم ہو گئی اور اس کے مضرات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میسلو فیناک ایک خارکب ہے جو کہ بھول کے دردار جوڑوں کے دردار بخار میں اپنی بہتر کارکردگی پہلے کی دواوں کے مقابلے میں کافی بہتر پایا گیا اور مضرات بھی کم ہیں۔

Aclowan (Aceclofenac) is a Phenylacetic & Non-Steroidal Anti-Inflammatory drug (NSAID) that exhibits Analgesic, Antipyretic, Anti-Inflammatory and Anti-Arthritic activities.

INJECTION **Aclowan**

Aceclofenac (BP)

Composition: Each ml contains:

Aceclofenac.....25 mg

Mode of Action: aceclofenac is potential inhibitor of cyclooxygenase which is involved in the production of prostaglandins.

- Aclowan's bio-availability is almost 100%.
- Aclowan's peak plasma concentrations reaches within 1½ hours.
- Aclowan's mean plasma elimination half life is 4-5 hours.
- Aclowan is mainly excreted through urine.

Indications:



Dosage and Administration:

Aclowan injection is for S/C. or I/M. use only.

Horses & Camels: 25-30 ml daily

Cattle and Buffaloes: 20-25 ml daily.

Sheep and Goats: 3-5 ml daily.

Dogs & Cats: 0.5 -2 ml daily

Precaution: Aclowan injection should not be combined with other drugs in the same syringe. Use Sterile syringe.

Instruction: Keep away from children & Light.

ایکلووان انجکشن

ایکلووان انجکشن دواوں کے ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے جسے نان اسٹرائیڈل ائٹھی سوزش والی دوائیں (NSAIDs) کیا جاتا ہے۔

ایکلووان انجکشن Cyclo-oxygenase کے عمل کرو سکتا ہے جو جسم میں مختلف کیمیائی مادوں کی تیاری میں ملوث ہے۔ جن میں سے کچھ کو پروشال گینڈین ہین کے نام سے جانا جاتا ہے۔

ایکلووان انجکشن کی 100% Bio Availability ہے۔

ایکلووان انجکشن خون میں اپنی بیک پر ڈیڑھ گھنٹے میں موجود ہوتا ہے۔

ایکلووان انجکشن کی Half Life ۲ سے ۵ گھنٹے ہے۔

ایکلووان انجکشن بنیادی طور پر پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔

علامات:

مختلف اقسام کے بخار، جوڑوں کا درد، آپ لیش کا درد، درد، سوزش اور بخار کے متعدد جوہات جیسے، FMD، گنے کھانے سے وابستہ لمبیناٹس، نمویں، پوسٹ پارٹرم، میڑو لائیٹس، Joint ill، مٹا نیٹس اور یہ ورنی کرموں کی وجہ کا درد (Maggots)۔

خوراک اور طریقہ استعمال: زیر جلد یا گوشت میں لٹکائیں۔

اونٹ اور گھوڑا: ۲۵ سے ۳۰ ملی لیٹر روزانہ۔ گائے اور کھیتیں: ۲۰ سے ۲۵ ملی لیٹر روزانہ۔

بھیڑ اور بکری: ۳ سے ۵ ملی لیٹر روزانہ۔ کتے اور بیلی: ۵ سے ۲۰ ملی لیٹر روزانہ۔

احتیاط:

ایکلووان انجکشن کو ایک ہی سرخ میں دوسری دوائیوں کے ساتھ ملا کر نہ دیں۔ جراحتیم سے پاک سرخ کا استعمال کریں۔ روشنی اور پیچوں کی پیچنے سے دور رکھیں۔