

A New Addition in Nawan Family



Amovet-GT

INJECTION

Gentamycin + Amoxicillin

Powerful Protection " Amoxicillin with Gentamicin:
Your Animal's Wellness Shield!

 **NAWAN**
LABORATORIES (PVT.) LTD.

Amovet-GT

INJECTION

Gentamycin + Amoxicillin

ایموویٹ۔ جی ٹی انجکشن

COMPOSITION:

Each ml Contains:

Amoxicillin as trihydrate.....150mg
Gentamycin as Sulphate.....40mg
(As per innovator's Specs)

INDICATION:

AMOVET-GT Injection is indicated for the treatment of Pneumonia, Diarrhea, Bacterial Enteritis, Mastitis, Metritis and Cutaneous abscesses in ruminants.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Administration the following dose by deep intramuscular (IM) Injection.

Cattle, Buffalo: 10ml per 100kg body weight.

Sheep, Goat: 5ml per 50kg body weight.

Poultry: 0.3 per 3kg body weight.

- General dosage is 1ml per 10kg body weight per day for 3 days.
- Do not repeat to inject 20ml in cattle and more than 5ml in calves at same injection site for better absorption and dispersion of drug.

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat: 30 days **Milk:** 2 days

INSTRUCTION:

- Store below 30°C in a dark and dry place.
- Protect from heat and light.
- Keep medicine out of the reach of children.

FOR VETERINARY USE ONLY

صرف جانوروں کے استعمال کیلئے



nl NAWAN

LABORATORIES (PVT.) LTD.

Animal Health Division

136, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.

علامات:

ایموویٹ جی ٹی انجکشن مویشیوں میں نمونیا، ڈائریا، بیکٹریل اینٹرائٹس (انٹریوں کی سوزش)، میٹرائٹس (حوانہ کی سوزش)، میٹرائٹس اور جلدی پھوڑوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال:

مندرجہ ذیل خوراک پٹھوں میں روزانہ ایک مرتبہ، ۳ دن تک استعمال کریں۔

گائے/بھینس: ۱۰۰ ملی لیٹر فی ۱۰۰ کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق استعمال کریں۔

بھیڑ و بکری: ۵۰ ملی لیٹر فی ۵۰ کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق استعمال کریں۔

پولٹری: ۰.۳ ملی لیٹر ۳ کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق استعمال کریں۔

گائے بھینس میں ۲۰ ملی لیٹر اور پھوڑوں میں ۵ ملی لیٹر سے زیادہ ایک ہی جگہ پر دوسری مرتبہ

انجکشن نہ لگائیں تاکہ دوا صحیح طور پر جذب ہو سکے۔

وڈرال کا عرصہ: گوشت: ۳۰ دن دودھ: ۲ دن

ہدایات:

۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک نسبتاً تاریک جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

پینسلین اور امائینوگلائیکوسائیڈ سے حساسیت رکھنے والے جانوروں میں استعمال نہ کریں۔