
Need of every

INVESTOC

in Pakistan



Q Long Acting (48 hours)

Most Economical Treatment of Costly Diseases

INJECTION (Amoxicillin)

جانوروں کے جراثیمی امراض کاموثر علاج ہے کیونکہ

- 🧟 وسیع الاثر دواہے۔
- ، جسم میں دیر تک رہ کر جرا نثیموں کےخلاف زیادہ بہتر کا م کرتی ہے۔
 - 🧿 مہنگی بیار یوں کےخلاف سنتی دواہے۔





AMOVET (Amoxicillin)

AMOVET L.A. FEATURES & BENEFITS: Amovet L.A. is a Semi-synthetic penicillin. Amovet L.A. long acting formulation to reach and maintain effective level for a period of 48 hours in the blood. Amovet L.A. Broad spectrum antibiotic effective against a wide range of Gram Positive and Gram negative bacterias. Amovet L.A. Protects from secondary bacterial infection when given in a viral diseases.

SUPERIOR PROTECTION FOR A HIGH INFECTED DISEASES LARGE AND SMALL ANIMALS:

Respiratory Tract infections, including: Pneumoniae
Paemorrhagic
Petropolic
Phaemorrhagic
Phaemorrhagi infections including: Cystitis Metritis Skin & Sof tissue infections including: Wound Abscesses @ Mastitis @ Foot and joint infections Prevention of post operative infection (After Surgery) Amovet L.A. may also used as an adjunct to the intramammary therapy to bovine mastitis. Poultry: For the treatment of infections caused by a wide range of Gram positive as well as Gram negative bacteria especially as: - Escherichia coli (E. coli), Mycoplasma. Pasteurella spp. Salmonella spp. etc. - It also eradicates chronic respiratory disease (C.R.D.) and infectious Coryza.

PRESCRIBING INFORMATION:

Composition: Each ml contains: Amoxicillin (as Amoxicillin Trihydrate) B.P. 150 mg Indications: Amovet L.A. is highly effective in respiratory, Alimentary, Urogenital tract infections (including cystitis and metritis). Skin and soft tissue infections (including abscesses, foot infections, joint and navel ill). Amovet L.A. produces quick & sustained action in 48 hours. Dosage & Administration: Poultry: 0.2 ml / 1 Kg Sheep & Goats: 4.0 ml / 40 Kg, Cows: 30.0 ml / 300 Kg, Buffaloes & Camels: 40.0 ml / 400 Kg @ Intramuscular route through 18G needle. Precautions: 1. If dosage is more than ml divide & give injection at two sites. 2. If necessary repeat dose after 48 hours. 3. Store below 30°C in a dark and dry place away from children.

Withdrawal Period: Meat: 21 days, Milk: 3 days





50ml

ایمووبیط ایل اے انجلش

کلیہ: ایک ملی لیٹر میں موجود ہے:۔ ایموکسیلین (ٹرائی ہائیڈریٹ) ۱۵۰ ملی گرام ۔ ا**یموویٹ ایل ائے** نہایت مفیرکن ہے۔ یہ جراثیبی بیار یوں کا فوری یقینی اور کلمل خاتمہ کرتا ہے۔ خون میں شامل ہوکر اپنی ا نتهائی سطح برقر اررکھتا ہےاور بیاری کی عبکہ پہنچ کر جراثیم کو جڑ سے ختم کر تاہے۔ بیسانس، پیشاب، آنتوں اورمعدہ کی بیاریوں، کھال اور نرم اعضاء کی بیاریوں میں مفید ہے۔ **خوراک اور طریقہ علاج: بولٹری: ۲ء۰ م**لی لیٹر فی کلوگرام جسمانی وزن، جيراور بريان: ٢٠ ملي ليرفى ٢٠ كوكرام جسماني وزن، كات سل لير في ٢٠٠٠ كلوكرام جسماني وزن، مبینس اور اونف: ۴۰ ملی لیر فی ۴۰۰ کلوگرام جسمانی وزن ودورال کاعرصه: محوشت: ۲۱ دن، دوده ۳۰ دن **پیکنگ: ۵۰ ملی لیٹر اور ۱۰۰ ملی لیٹروائل میں دستیاب ہے۔**

> MANUFACTURED BY: NAWAN

136, Sector 15, Korangi Industrial Area, Karachi-Pakistan. Tel+ 92 21 35065835-7 LABORATORIES (PVT.) LTD. | Web: www.nawanlab.com