

The **Power**
against Important Bacterial Diseases
including **Mastitis**

AMPiCOX

Injection



 **NAWAN**
LABORATORIES (PVT.) LTD.

Mastitis is a multifactorial and costly problem, which occur in all milk producing ruminants. It affects animal welfare and results in decreased milk production and deterioration of the milk quality.

AMPICOX

Injection

ایمپی کوکس انجکشن

Uniqueness of Ampicox

- Ampicox is a drug of choice against MASTITIS, because it is resistant to enzymes produced by bacteria Penicillinase or β -lactamase (an enzyme which destroys β -lactam ring).
- Amoxicillin is not active against penicillin G resistant Staph.; whereas, Ampicox is active against them.

Composition: Each ml contains: Ampicillin (as trihydrate) B.P. : 125 mg Cloxacillin base B.P. : 125 mg

Indications: For the treatment of gastrointestinal, respiratory & urinogenital tract infections including metritis, mastitis, septicaemia & wound infections.

Dosage:

Animals	Weight	Dose
Poultry	1 kg	0.15 ml
Sheep & Goats	50 kg	5 ml
Cattle	300 kg	30 ml
Camels & Horses	500 kg	50 ml

Administration:

I/M or Subcutaneously.

Withdrawal Period:

Meat : 7 days Milk : 7 days

Precautions:

1. Should always be stored in a very cool & dark place protected from direct sun rays.
2. Keep away from the reach of children.

Packing:

50ml, 100ml Vials.

Both Ampicillin and Cloxacillin attain high concentration in soft tissues, therefore AMPICOX is highly recommended for treating mastitis in animals.

ایمپی کوکس انجکشن دونہایت موثر وسیع العمل پینسلین گروپ کے ارکان کا مرکب ہے جو کہ حوانہ کی سوزش، آنتوں، معدہ، نظام تنفس اور پیشاب کی نالیوں میں پیدا ہونے والی بیشتر عفونتوں کا مکمل علاج ہے۔

مویشیوں میں تھن کی سوزش کے علاج کیلئے ایک منفرد انجکشن۔

کلیہ: ایک ملی لیٹر میں موجود ہے۔

ایمپیسلین (ٹرائی ہائیڈریٹ) ۱۲۵ ملی گرام
کلاکزا سیلین (بیس) ۱۲۵ ملی گرام

خوراک:

جانور	وزن	خوراک
پولٹری	۱ کلو گرام	۰.۱۵ ملی لیٹر
بھینر، بکری	۵۰ کلو گرام	۵ ملی لیٹر
گائے	۳۰۰ کلو گرام	۳۰ ملی لیٹر
گھوڑا۔ اونٹ	۵۰۰ کلو گرام	۵۰ ملی لیٹر

استعمال: عضلاتی یا زیر جلد انجکشن دیا جائے۔

ودڈرال کا عرصہ:

گوشت: ۷ دن دودھ: ۷ دن

احتیاطیں: پینسلین سے الرجک جانوروں میں استعمال ممنوع ہے۔ گردوں کی خرابی کی صورت میں بھی دوائی استعمال نہ کریں۔

پیکنگ: ۵۰ ملی لیٹر، ۱۰۰ ملی لیٹر وائلز۔



MANUFACTURED BY:



NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.