



ASCOR-C

(Ascorbic Acid)

POWDER



NAWAN

LABORATORIES (PVT.) LTD.



ایسکور سی پاؤڈر

خوراک اور طریقہ استعمال:

پولٹری: 50 ملی گرام سے 100 ملی گرام ascorbic acid فی کلوگرام جسمانی وزن فی دن 3 سے 5 دن تک، زبانی طور پر، جو 0.5 سے 1 جی پاؤڈر ہے زبانی محلول فی لیٹر پینے کے پانی میں روزانہ 3 سے 5 دن تک۔

دیگر اقسام: 10 ملی گرام سے 20 ملی گرام ایسکوربک ایسڈ فی کلوگرام جسمانی وزن کے لیے روزانہ 3 سے 5 دن تک، زبانی طور پر، جو کہ 0.1 سے 0.2 گرام پاؤڈر زبانی حل کے لیے 10 کلوگرام جسمانی وزن کے لیے 3 سے 5 دن تک۔

دواؤں کے پینے کے پانی، دودھ، یا مائع فیڈ کی مقدار جانوروں کے ذریعہ استعمال کی جاتی ہے اس کا انحصار ان کی جسمانی اور طبی حالت پر ہوتا ہے۔ ascorbic acid فی کلو جسمانی وزن کی تجویز کردہ خوراک کی عمر کو حاصل کرنے کے لیے، مائع میں پتلا کیے جانے والے پاؤڈر کی مقدار کو اسی کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے۔

ودڈرال کا عرصہ: مویشی، بھیڑ اور بکری۔

گوشت اور آفل: صفر دن۔ دودھ: صفر دن۔

خرگوش کا گوشت اور آفل: صفر دن۔ گھوڑا: لاگو نہیں ہے۔

ہدایات: 30 ڈگری سے کم درجہ حرارت پر، خشک جگہ پر محفوظ کریں۔

روشنی اور نمی سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

صرف رجسٹرڈ ویٹرنری پریکٹیشنر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا کریں۔

ASCOR-C

(Ascorbic Acid)

POWDER

Composition: Each gram contains:
Ascorbic Acid.....1000 mg.
(As per Innovator's Specifications)

Target Species:

Horse, Cattle, Sheep, Goat,
Rabbits & Poultry.

Indications:

- Treatment of vitamin C deficiencies.
- Supportive treatment for asthenia, especially during infectious episodes and stress.

Dosage and route of Administration:

Poultry: 50 mg to 100 mg of ascorbic acid per kg of body weight per day for 3 to 5 days, orally, which is 0.5 to 1 g of powder for oral solution per liter of drinking water per day for 3 to 5 days.

Other species: 10 mg to 20 mg of ascorbic acid per kg of body weight per day for 3 to 5 days, orally, which is 0.1 to 0.2 g of powder for oral solution for 10 kg of body weight per day for 3 to 5 days.

The amount of medicated drinking water, milk, or liquid feed consumed by the animals depends on their physiological and clinical condition. To achieve the recommended dosage of ascorbic acid per kg of body weight, the amount of powder to be diluted in the liquid must be adjusted accordingly.

Withdrawal Period:

Cattle, Sheep & Goat.

Meat and offal: zero days. Milk: zero days.

Rabbits Meat and offal: zero days. Horse: not applicable.

Instructions:

Store below 30°C, in a dry place.

Protect from light & moisture. Keep out of reach of children.

To be used as directed by the registered veterinary practitioner only.

MANUFACTURED BY:



NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division

136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.

