

# The Reliable Brand for Cure



The most potent and  
authentic analgesic and  
**anti-inflammatory**  
drug for **livestock**

 **NAWAN**  
LABORATORIES (PVT.) LTD.

INJECTION  
**AVCEN**  
Flunixin Meglumine (B.P.)

# AXCEN INJECTION

## Flunixin Meglumine (B.P.)



**Composition:** Each ml contains:  
Flunixin as Meglumine (B.P.) ..... 50 mg  
(Mfg. Nawan Specs.)

**Description:** Flunixin Meglumine is a potent, non-narcotic, non-steroidal, analgesic agent with anti-pyretic activity. Flunixin Meglumine acts as an inhibitor of cyclo-oxygenase which sensitize pain receptors. Flunixin Meglumine is a weak acid which exhibits a high degree of protein binding (99%).

**Indications:** Axcen Injection is a relatively potent non-narcotic, non-steroidal analgesic with anti-inflammatory, anti-endotoxic and anti-pyretic properties. It is indicated in Musculoskeletal disorders associated with Pain, Inflammatory Arthritis, Carpalitis, Tendinitis, Myositis & Lameness. It is also indicated in Pneumonia & Pasteurella infections. It is also effective in diarrhoea, abdominal pain, colic, pre and post ophthalmic and general surgeries, bacterial endotoxic shock in horses and dogs & adjuvant therapy in Mastitis. It is also indicated for the treatment of heat stroke in dogs.

### Dosage and administration:

**Horse & Camel:** 1ml/45kg body weight.

**Cattle & Buffalo:** 1ml/45kg body weight.

**Sheep & Goat:** 1ml/45kg body weight.

**Dogs:** 0.5-2ml/45kg by IV once per day for no longer than 3 days.

Administer the above mentioned dose by deep intramuscular or slow intravenous injection. Repeat the dose after 6 to 12 hours if needed.

**Contraindications:** ❖ Do not use in animals showing hypersensitivity to Flunixin Meglumine. ❖ Intra-arterial injection should be avoided in horses. ❖ Don't mix the injection with other injections. ❖ Consult the veterinarian before use.

**Withdrawal Period: Meat:** 4 days. **Milk:** 36 Hours.

**Storage Conditions:** Store below 30°C in dark and dry place, away from children.

**Packing:** 10x10ml, 50ml.

## ایکسین انجکشن

**کلیہ:** ایک ملی لیٹر میں موجود ہے۔ فلونگزن بطور میٹیلو مین ..... ۵۰ ملی گرام

**علامت:** ● جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھنچاؤ، لنگڑاہٹ کے درد، سوزش اور زخموں کے درد کے لئے۔

● نظام تنفس کے امراض مثلاً مونونیا وغیرہ کے علاج کے لئے۔

● نظام ہضم میں اسہال اور درد وغیرہ کیلئے۔ ● مختلف قسم کی جراحی سے پہلے اور بعد میں۔

● سوزش حیوانہ کے علاج کیلئے۔ ● شدید درد کیلئے۔ ● بخار کم کرنے کیلئے۔

● گھوڑوں میں پیٹ کے شدید درد کے لئے۔

### خوراک اور طریقہ استعمال:

مندرجہ ذیل خوراک پٹھوں یا ورید میں انجکشن لگائیں۔

اگر ضرورت پیش آئے تو ۱۲ گھنٹوں میں ۱-۲ مرتبہ استعمال کریں۔

گھوڑا/اونٹ: اٹلی لیٹر فی ۴۵ کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق۔

گائے/بھینس/بھیڑ/بکری: اٹلی لیٹر فی ۴۵ کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق۔

بٹا: ۰.۵-۲ ملی لیٹر فی ۴۵ کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق ورید میں انجکشن لگائیں،

انجکشن ۳ دن سے زیادہ مسلسل استعمال نہ کریں۔

**دو ڈال کا عرصہ:** گوشت: ۴ دن۔ دودھ: ۳۶ گھنٹے

**ہدایات:** ۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک اور نسبتاً تاریک جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

**پیکنگ:** ۱۰x۱۰ ایکٹ۔ ۵۰ ملی لیٹر

MANUFACTURED BY:



**NAWAN**  
LABORATORIES (PVT.) LTD.

136, Sector 15, Korangi Industrial  
Area, Karachi-Pakistan.  
Tel+ 92 21 35065835-7  
Web: www.nawanlab.com