

The best remedy of clinical **Mastitis** in Lactating Cows



**Pakistan's
1st**

Company to Manufacturing
4th Generation
*Cephalosporin Antibacterial
Intramammary Tube*

8gm

12 Syringes Box

Cefanil

(Cefquinome) IMM INJECTOR

Intramammary Suspension

 **NAWAN**
LABORATORIES (PVT.) LTD.

Cefanil

(Cefquinome) IMM INJECTOR

Intramammary Suspension



8gm

12 Syringes Box

۸ گرام

سیفانل آئی ایم ایم انجیکٹر

علامات:

سیفانل انٹرا میمری ٹیوب گائے، بھینس میں حیوانہ کی سوزش کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دودھ دینے والے جانوروں میں اس کے استعمال سے بہترین نتائج سامنے آئے ہیں۔ سیفانل انٹرا میمری ٹیوب ساڑو/ حیوانہ کی سوزش کا باعث بننے والے بیکٹریا جیسے سٹیفیلوکوکس اور لیس، سٹرپٹوکوکس اوپیرس، سٹرپٹوکوکس ڈسگلیکٹیا اور ای۔کولائی کے خلاف انتہائی موثر ثابت ہوئی ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال:

ساڑو سے متاثرہ تھن سے دودھ اچھی طرح نکال لیں۔ تھن کو اچھی طرح صاف کرنے اور جراثیم کش محلول میں ڈبونے کے بعد انجیکٹر میں موجود دوائی کو متاثرہ تھن میں آہستگی سے انجیکٹ کریں۔ دوائی کو متاثرہ تھن میں اچھی طرح پھیلانے کے لیے تھن کا آہستہ سے مساج کریں۔ اچھے نتائج کے لئے ساڑو سے متاثرہ تھن میں لگاتار تین مرتبہ ہر ۱۲ گھنٹے بعد سیفانل ٹیوب کا استعمال کریں۔

ہدایات:

۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک اور نسبتاً تاریک جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

COMPOSITION:

Each 8 gm syringe contains:
Cefquinome as sulphate.....75 mg
(As per Innovator's Specification)

INDICATION:

For the treatment of clinical mastitis in the lactating dairy cow caused by the following cefquinome-sensitive organisms: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus and Escherichia coli.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

The content of one syringe should be infused gently into the teats of the infected quarter after every 12 hours for three successive milkings.

Milk out the affected quarter(s). After thoroughly cleaning and disinfecting the teat and teat orifice, gently infuse the contents of one syringe into each affected quarter. Disperse the product by gently massaging the teat and udder of the affected animal.

WITHDRAWAL PERIOD:

Milk: 5 days. Meat: 4 days.

INSTRUCTIONS:

Store below 30°C in a dark and dry place away from children.



MANUFACTURED BY:



NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division

136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.