


All Rounder Because Infection and Pain Go Together



CEFUR DUO

INJECTION
(Ceftiofur HCl- Ketoprofen)

 **NAWAN**
LABORATORIES (PVT.) LTD.



All Rounder Because Infection and Pain Go Together

CEFUR DUO

INJECTION
(Ceftiofur HCl- Ketoprofen)

Composition: Each ml contains:
Ceftiofur (as hydrochloride) 50 mg &
Ketoprofen 150 mg.
(As per Innovator's Specification)

Target Species: Cattle.

Indications: For the treatment of bovine respiratory disease (BRD) caused by Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida sensitive to ceftiofur and the reduction of clinical symptoms associated with inflammation and pyresia.

Dosage and Route of Administration: *Intramuscular use.*

1 mg of ceftiofur/kg/day is 3 mg of ketoprofen/kg/day per intramuscular injection corresponding to 1 ml/ 50 kg per each injection 3-5 days. The veterinary medicinal product should be used only when the disease is associated with clinical signs of inflammation or pyrexia. Only a few animals will need to administer a fourth or fifth injection with the combined product.

Withdrawal Period: Meat and offal: 8 days. Milk: zero hours.

Instructions: Store below 25°C. Protect from light and moisture. Keep out of the reach of children. To be used as directed by the registered veterinary practitioner only.



سیفرو ڈیو انجکشن

علامات: یہ داموں یوں میں بیکھیر یا نہیا ہمیو لا یکا اور پا چکور یا ملٹھو سیڈا سے بیدا ہونے والی یوں اس ریسپارٹری ڈیزیز (BRD) کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سوڑش اور بخار سے متعلقہ علامات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خوراک اور طریقہ استعمال: صرف عضلانی انجکشن (Intramuscular) سیفیو ڈیو: 1 ملی گرام فی 50 کلوگرام جسمانی وزن۔ کیٹو پروفین: 3 ملی گرام فی 50 کلوگرام جسمانی وزن۔ (ہر انجکشن تقریباً 1 ملی لیٹر فی 50 کلوگرام وزن کے برابر)۔ یہ دو اصرف انہی کیسر میں استعمال کی جائے چاہیے۔ ساتھ سوڑش یا بخار کی علامات موجود ہوں۔ چند جانوروں میں چوتھے یا پانچوں دن اضافی خوراک کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ودڑال کا عرصہ: گوشت: 8 دن۔ دودھ: صفر گھنٹے۔ دہیات: 5°C سے 2°C تک درجہ حرارت پر محفوظ رکھیں۔ روشنی اور نیچے سے پچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ یہ دو اصرف رجسٹرڈ ڈیزی ڈاکٹر کے مشورے اور ہدایت کے مطابق استعمال کی جائے۔