

CEREX

DRENCH

For the control of


Fascioliasis

& larval stages of

Stomach,

gut &

Lungworms



Levamisole, Triclabendazole

CEREX

DRENCH

سیریکس ڈرینج

علامات:

سیریکس ڈرینج بالغ اور نابالغ معدہ اور آنتوں کے گول کرم اور پھیپھڑوں کے کرم (Trichostrongylus) اور جگر کے کرم کی تمام اسٹیجز (Stages) کے خلاف ایک مؤثر دوا ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال:

بذریعہ منہ۔ 10 ملی گرام ٹرائی کلابینڈازول اور 7.5 ملی گرام لیوامیسول ہائیڈروکلورائیڈ فی کلو جسمانی وزن یا 1 ملی لیٹر فی 5 کلو گرام جسمانی وزن کے مطابق استعمال کریں۔

10 کلو گرام وزن - 2 ملی لیٹر	15 کلو گرام وزن - 3 ملی لیٹر
20 کلو گرام وزن - 4 ملی لیٹر	30 کلو گرام وزن - 6 ملی لیٹر
40 کلو گرام وزن - 8 ملی لیٹر	50 کلو گرام وزن - 10 ملی لیٹر
60 کلو گرام وزن - 12 ملی لیٹر	

Levamisole, Triclabendazole

COMPOSITION: Each 100ml Contains:

Levamisole HCl 3.750gm

Triclabendazole 5gm

(As per Innovator's Specifications)

TARGET SPECIES: Camel, Cattle, Sheep & Goat.

INDICATIONS: For the treatment of infestations of:

Lungworm: Dictyocaulus spp.; Roundworm:

Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Ostertagia

spp., Haemonchus spp., Nematodirus spp.,

Bunostomum spp., Oesophagostomum spp.,

Gaigeria spp., en Chaber-tia spp.; Liverfluke:

Fasciola hepatica.

DOSAGE & ROUTE OF ADMINISTRATION:

Oral administration. 10 mg triclabendazole and 7.5 mg levamisole hydrochloride per kg body weight, corresponding to 1 ml of the veterinary medicinal product per 5 kg body weight. Depending on the body weight of the sheep, the dosage of the veterinary medicinal product is as follows:

10 kg weight - 2ml	15 kg weight - 3ml
20 kg weight - 4ml	30 kg weight - 6ml
40 kg weight - 8ml	50 kg weight - 10ml
60 kg weight - 12ml	

WITHDRAWAL PERIOD: Meat and offal: 42 days.

Not permitted for use in ewes producing milk for human consumption, including during the dry period. Do not use within 1 year prior to first lambing in ewes intended to produce milk for human consumption.

INSTRUCTION: Store below 25 °C.

Protect from light. Keep out of reach and sight of children. Discard unused product. To be used as directed by the registered veterinary practitioner only.

ودڈرال کا عرصہ: گوشت: 42 دن۔

ہدایات: 25 ڈگری سے کم درجہ حرارت پر محفوظ کریں۔ روشنی سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ غیر استعمال شدہ محلول کو ضائع کریں۔ صرف رجسٹرڈ ویٹرنری پریکٹیشنر کی ہدایت پر استعمال کریں۔

MANUFACTURED BY:
NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.

