


*Protect*  
**aggressive attack**

*of Trypanosomiasis & Babesiosis*



For the Treatment and  
prevention of  
Trypanosomiasis  
and Babesiosis

# Dianox

Diminazine Aceturate,  
Antipyrine (USP)

Injection



 **NAWAN**  
LABORATORIES (PVT.) LTD.

# ڈایانوکس انجکشن



علامات:

ڈایانوکس انجکشن دودواؤں کا بہترین مرکب ہے جو کہ ٹریپانوسومی ایمر اور بھی سولیسر کی بیماری جڑو مد ٹریپانوسوما کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اسکے علاوہ دوسرے جراثیم مثلاً بھی سیویسز اور پارٹو پلازما کے خلاف بھی انتہائی موثر انجکشن ہے۔ ایٹھی پائریں ہر طرح کے درد بخارا اور سو جین سے جانوروں کو نجات دلاتا ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال:

عمومی طور پر ۳۰۰ ملی لیٹر فی ۱۰ کلوگرام وزن کے مطابق

گائے، بھینس: ۱۰ ملی لیٹر فی ۳۰۰ کلوگرام

بھیڑ، بکری: ۳۰۰ ملی لیٹر فی ۱۰ کلوگرام

گھوڑے، گدھے: ۱۰ ملی لیٹر فی ۳۰۰ کلوگرام

■ صرف پٹھوں (عضلات) میں لگانے کا ٹیکہ ہے۔

احتیاطیں:

- حساس جانوروں میں استعمال سے گریز کریں۔
- بتائی گئی خوراک سے زائد استعمال نہ کریں۔
- ۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک اور نسبتاً تاریک جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

پیکنگ:

۱۰ x ۱۰ ملی لیٹر اور ۵ ملی لیٹر وائٹل میں دستیاب ہے۔

# Dianox

## Diminazine Aceturate, Injection Antipyrine (USP)

### COMPOSITION:

Each ml contains:

Diminazine Aceturate ..... 105 mg

Antipyrine ..... 131 mg

(As per Innovator's Specification)

### TARGET SPECIES:

Cattle, Sheep, Goats, Horses and dogs.

### INDICATIONS:

Treatment of trypanosomiasis, babesiosis (piroplasmosis) and mixed infections caused by trypanosomes and babesia in Cattle, Sheep, Goats, horses and dogs. Dianox Injection is also intended for the control of processes associated with reduced immunity, in the case of temporary disappearance of ticks from the place of animal breeding or transportation from a tick-free area to a heavily infested area.

### DOSAGE AND ROUTE OF ADMINISTRATION:

For deep intramuscular administration.

Cattle & Horses: 1 ml /30 kg Body Weight.

Sheep & Goat: 0.3ml /10kg Body weight.

Dogs: 1 ml /22 kg body weight.

When administered to horses, it is necessary to divide the dose between 2 and 3 injection sites with an interval of 1 hour between injections to avoid a corresponding manifestation of colic. If it is necessary to repeat the treatment, it can be done after 24 hours. A maximum of 3 treatments can be performed with an interval of 1 day.

### WITHDRAWAL PERIOD:

Cattle Sheep & Goat: Meat: 21 Days

Horse & Dog: Not Applicable.

### INSTRUCTIONS:

Store below 30°C.

Protect from heat and light.

Keep out of reach of children.

MANUFACTURED BY:



**NAWAN**  
LABORATORIES (PVT.) LTD.

136, Sector 15, Korangi Industrial Area, Karachi-Pakistan.  
Tel+ 92 21 35065835-7  
Web: www.nawanlab.com