

# DIMADIN

INJECTION

(Sulphadimidine)



**NAWAN**  
LABORATORIES (PVT)-LTD.



# DIMADIN

(Sulphadimidine) INJECTION

**Composition:** Each 100ml Contains:  
Sulphadimidine .....33.333gm

**Target Species:**

Cattle, Sheep, Goat, Poultry & Rabbit.

**Indications: In cattle, sheep and goats:**

- Treatment and metaphylaxis of respiratory and digestive infections. **In poultry and rabbits:**

- Treatment and metaphylaxis of respiratory and digestive infections. - Treatment and metaphylaxis of digestive coccidiosis.

The presence of the disease in the group must be established before use of the product.

**Dosage and Route of Administration:**

Intravenous, intramuscular or intraperitoneal routes.

**In Cattle, Sheep, Goats:** 90 mg of sulfadimidine per kg of body weight per day for 3 consecutive days, by intravenous, intramuscular or intraperitoneal route, i.e. 3 mL per 10 kg of body weight per day for 3 consecutive days.

**In poultry and rabbits:** 150 mg to 180 mg of sulfadimidine per kg of body weight per day for 3 consecutive days,

**Withdrawal Period:** Cattle, sheep and goats:

Meat and offal: 12 days. Milk: 5 days.

**Rabbits:** Meat and offal: 12 days.

**Poultry:** Meat and offal: 12 days.

Eggs: In the absence of an MRL for eggs, do not use in laying species producing eggs for consumption, 4 weeks before the start of laying and during laying.

**Instructions:** Store below 25°C.

Protect from light and moisture. Keep out of the reach of children. To be used as directed by the registered veterinary practitioner only.



## ڈیماڈن انجکشن

خوراک اور طریقہ استعمال: انٹراوینس، انٹراسکلر یا انٹراپیئرینوٹیل راستے۔

مویشی، بھیڑ، بکریوں میں: مسلسل 3 دن تک 90 ملی گرام سلفاڈیماڈائن فی کلوگرام جسمانی وزن فی دن، انٹراوینس، انٹراسکلر یا انٹراپیئرینوٹیل راستے سے، یعنی 3 ملی لیٹر فی 10 کلوگرام جسمانی وزن مسلسل 3 دن تک۔ پولٹری اور خرگوش میں: 150 ملی گرام سے 180 ملی گرام سلفاڈیماڈائن فی کلوگرام جسمانی وزن فی دن لگاتار 3 دن تک،

ودڈ رال کا عرصہ: مویشی، بھیڑ اور بکریاں: گوشت اور آفل: 12 دن۔ دودھ: 5 دن۔ خرگوش: گوشت اور آفل: 12 دن۔ مرغی: گوشت اور آفل: 12 دن۔ انڈے: انڈوں کے لیے ایم آر ایل کی عدم موجودگی میں، بچھانے کے آغاز سے 4 ہفتے پہلے اور بچھانے کے دوران استعمال نہ کریں۔

ہدایت: 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر محفوظ کریں۔ روشنی اور نمی سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ صرف رجسٹرڈ ویٹرنری پریکٹیشنر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے۔

MANUFACTURED BY:  
**NAWAN**  
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division  
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,  
Karachi-Pakistan.