



Keep Your Flock Healthy

Say Good-Bye
to all Mycoplasma and Secondary
Bacterial Infections in Poultry

Doximax
(Doxycycline HCl, Tylosin Tartrate,
Colistin Sulphate, Bromhexine HCl) **POWDER**

Doximax

(Doxycycline HCl, Tylosin Tartrate, Colistin Sulphate, Bromhexine HCl) P O W D E R

Composition: Each kg powder contains:
 Doxycycline HCl B.P. 200gm,
 Tylosin Tartrate B.P. 100gm,
 Colistin Sulphate B.P. 50 M.I.U.,
 Bromhexine HCl 2gm
 (Mfg. Nawan Specs.)

Indications: Doximax is a combination of broad spectrum antibiotics which effectively covers Gram-positive, Gram-negative bacteria & most of the Mycoplasma spp. Doximax is indicated to control & treat all infections caused by microbes which are sensitive to Tylosin & Doxycycline. Doximax fastly cures the respiratory, gastro-intestinal & urino-genital tract infections in poultry & livestock. It inhibits E.Coli, Salmonella, Shigella species, Pseudomonas Aeruginosa and Proteus Vulgaris, all infections in gut, Coryza, Pneumonia Vibronic hepatitis.

Prevention Dose: 1gm powder per 4 liter drinking water.

Dosage: Poultry: 1 gm powder per 2 lit. of drinking water for 3 to 5 days. Calves: Orally give 1 to 1.5 gm powder per calf weighing about 50 kg to 60 kg in drinking water on daily basis, treatment period 3 to 5 days.

Withdrawal Period: Poultry: 4 days.
Calves: Meat: 7days.

Storage Conditions: Store below 30°C in a dark & dry place away from children.

Packing: 500gm, 1kg Jar.

ڈوکسی میکس پاؤڈر

کلیہ: ایک کلوگرام پاؤڈر میں موجود ہے:-
 ڈوکسی سائیکلین ہائیڈروکلورائیڈ: ۲۰۰ گرام۔ ٹائلوئین ٹارٹریٹ: ۱۰۰ گرام۔
 کولسٹین سلفیٹ: ۵۰ ایم۔ آئی۔ یو۔ برومہیکسین ہائیڈروکلورائیڈ: ۲ گرام۔
 علامات: ڈوکسی میکس پاؤڈر نہایت طاقتور وسیع الاثر اینٹی بائیوٹیک کامرکب ہے جس کے دائرہ عمل میں بیشتر مرض آور گرام مثبت، گرام منفی، بیکیٹیریا اور مائیکوپلازما آتے ہیں۔ ڈوکسی میکس پاؤڈر مرغیوں میں سانس کی بیماریوں کوئی تیزی لوٹس، سی۔ آر۔ ڈی، سی۔ سی۔ آر۔ ڈی، فاؤل کالرہ کے ساتھ ساتھ آنٹوں کی بیماری میں نہایت موثر ہے مزید یہ کہ چھٹروں میں اسہال کے امراض اور سانس کے انفیکشن میں بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔
 خوراک: بطور علاج: مرغیوں میں ایک گرام پاؤڈر ۲ لیٹر پانی میں ملا کر تین سے پانچ دن تک پلائیں۔
 بطور احتیاط: ایک گرام پاؤڈر ۴ لیٹر پانی میں۔
 چھٹروں میں ایک سے ڈیڑھ گرام پاؤڈر فی چھٹرا جس کا وزن ۵۰ سے ۶۰ کلوگرام تک ہو، روزانہ پانی میں ملا کر پلائیں۔
 علاج تین سے پانچ دن تک جاری رکھیں۔ وڈر مال کا عرصہ: مرغیوں میں: ۴ دن دوائی کے استعمال کے بعد۔
 چھٹروں میں: گوشت: ۷ دن۔ ہدایات: ۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک اور نسبتاً تاریک جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
 پیکنگ: ۵۰۰ گرام، ۱ کلوگرام جار۔



Further information is available upon request:

nl NAWAN
 LABORATORIES (PVT) LTD.

Visit us at: www.nawanlab.com
 136, Sector 15, Korangi Industrial Area, Karachi-74900, Pakistan.