



HITTING HARD ON TARGET

**Rapid
Action,**
Broad
Spectrum
Activity for
**Poultry &
Livestock**



GENTAWAN-10

(Gentamicin) INJECTION

Benefits:

- Drug of Choice
- Most Economical
- Maximum Concentration
- Quick Health Recovery
- Significant reduction in Mortality & Morbidity



NAWAN
LABORATORIES (PVT.) LTD.

GENTAWAN-10

(Gentamicin) INJECTION

Composition: Each 100ml contains:
Gentamicin (as Sulfate)..... 10 gm (BP Specification)

Target Species: Cattle, Horses.

Indications: For the treatment of infections of the lower respiratory tract in cattle & horses caused by aerobic Gram negative bacteria susceptible to gentamicin.

Dosage & Route of Administration: Horses:

For intravenous use, administer a single dose of 6.6 mg/kg body weight once daily for 3–5 consecutive days. Ensure accurate body weight measurement to avoid incorrect dosing. Do not exceed the dosing regimen. Gentamicin is not recommended for use in foals and neonates.

Cattle: Single dose of 3-5 mg/kg body weight given S.C, IM & intravenously once daily for 3–5 consecutive days.

Withdrawal Period: Cattle: Meat : 7 days before slaughter.
Milk : 3 days after last treatment.

Instruction: Use within 28 days after first opening.
Store below 25°C. Store in the original carton in order to protect from light. Keep out of reach of children.



جینٹاوان-۱۰ انجکشن

خوراک اور طریقہ استعمال:

گھوڑے: 6.6 ملی گرام/کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق روزانہ ایک بار ۳ سے ۵ دن تک دیں۔ غلط خوراک سے بچنے کیلئے جسمانی وزن کی درست پیمائش کو یقینی بنائیں۔ تجویز کردہ خوراک سے تجاوز نہ کریں۔ جینٹا مائیسین فونز اور نوزائیدہ بچوں میں استعمال نہیں کی جاسکتی۔

۳-۵ ملی گرام/کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق بذریعہ زیر جلد یا عضلاتی روزانہ ۳-۵ دنوں تک دیں۔

ودڈرال کا عرصہ: مویشی: گوشت: ۷ دن - دودھ: ۳ دن۔

پہلی بار وائل کھولنے کے بعد ۲۸ دن کے اندر استعمال کریں۔

۲۵ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر محفوظ کریں۔

روشنی سے بچائیں۔

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

 **NAWAN**

LABORATORIES (PVT.) LTD.

Animal Health Division

136, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan