

50ml

Hepawan

(Phenoxy-2-Methyl-2-Propionic acid)

Injection

**The Ultimate Liver Function
Stimulator & Regenerator
At Economical Cost**



 **NAWAN**
LABORATORIES (PVT.) LTD.

ھیپاوان انجکشن

کلیہ

ایک ملی لیٹر انجکشن میں موجود ہے۔

فیونکسی-۲- میتھائل-۲- پروپونک ایسڈ ----- ۱۰۰ ملی گرام

ھیپاوان انجکشن کی خصوصیات:

ھیپاوان انجکشن میں موجود فیونکسی-۲- میتھائل-۲- پروپونک ایسڈ جگر میں موجود خاص قسم کے کیمیکیل پی۔ پی۔ اے۔ آر۔ الفا (PPAR alpha) کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ فیٹ (Fat) کے مینابولیزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کیمیکیل کی وجہ سے جگر میں موجود زائد چربی قابل استعمال حالت میں آ جاتی ہے۔ اور جسم میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی کیمیکیل جگر کی رطوبتوں (Secretions) میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ رطوبتیں سیدھا معدے اور آنتوں میں جا کر خوراک کو بہتر ہضم کروانے میں مدد کرتی ہیں۔ زائد چربی کے جسم میں استعمال ہونے سے کولیسترول کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہی ہارمون، ٹیسٹوسٹیرون، ایسٹراڈائیول کو بناتا ہے اور جانوروں میں جنسی کارکردگی، بچہ دینے کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔

علامات

ھیپاوان انجکشن مندرجہ ذیل علامات میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

گائے، بھینس، بکری اور بھیڑ: فنی لیور (جگر میں زائد چربی کو نکالنے کیلئے) قبض، اٹھارہ، بھوک کا نہ لگنا، جگر کے کرموں کے انفیکشن میں بطور معاون علاج، معدے کے کیٹوسس میں۔ گھوڑا: جگر کے افعال کو بہتر بنانے کیلئے، لیپو سپائزوسس اور پائرو پلازموسس کے علاج کے دوران جگر کے افعال کو بہتر بنانے کیلئے۔

گتا: ریتان کے علاج کیلئے، جگر کے افعال کو بہتر بنانے کیلئے، لیپو سپائزوسس اور Canine Distemper کے علاج میں بطور معاون استعمال کروایا جاسکتا ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال

صرف عضلاتی اور ویدی انجکشن کیلئے:

عمومی خوراک: 10 ملی گرام / کلو گرام جسمانی وزن (1 ملی لیٹر برطانی 10 کلو گرام جسمانی وزن) گائے، بھینس، گھوڑا۔ 300 کلو گرام وزن تک (30 ملی لیٹر) 500 یا اس سے زیادہ کلو گرام کیلئے (50 ملی لیٹر) 1 ملی لیٹر بحساب 10 کلو گرام جسمانی وزن پکینگ: 50 ملی لیٹر وائل۔

دو ڈرال کا عرصہ: گوشت اور دودھ: کوئی نہیں

خوراک 24 گھنٹے بعد ہر آئی جاسکتی ہے۔

30°C ڈگری سے کم خشک جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

Composition

Each ml contains

Phenoxy-2-Methyl-2-Propionic acid 100 mg
(As per Innovator's Specification)

Indications:

HEPAWAN is indicated in animals showing signs of Liver dysfunction & Gastrointestinal malfunctions

Cattle, Sheep & Goat: For the treatment of

- Fatty liver
- Rumen impaction
- Ketosis
- Tympany
- Rumen overload, indigestion
- Constipation
- As an adjuvant therapy during the treatment of Liver fluke infestation, during recovery period from illness to overcome stress & weakness

Horse:

For the treatment of liver dysfunction due to unbalanced feed, liver failure due to Piroplasmosis & Leptospirosis

Dog:

For the treatment of Icterus, Liver failure & as an adjuvant therapy during the treatment of Leptospirosis & Canine distemper

Route of Administration:

Deep Intramuscular, Slow intravenous, Intraperitoneal only

Dosage:

General recommended dose for all the species is 10mg/kg b.w. corresponding to the dose of 1ml for 10 kg b.w.

Cattle & Horse: Up to 300 kg b.w. 30ml
More than 500 kg b.w. 50 ml

Calves, Sheep, Goat, Lambs, Foals:

1 ml for 10 kg b.w.

Dog: 1ml for 10 kg b.w.

Dose can be repeated every 24 hours under Veterinary Supervision

Withdrawal Period: Meat & Milk: None

Packing: 50 ml

Storage: Store below 30°C in the dark place away from children

MANUFACTURED BY:



NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.