




TRUST US FOR THE BEST IN
LIVESTOCK CARE

IMICARE

INJECTION

(Imidocarb Dipropionate)



IMICARE

INJECTION

(Imidocarb Dipropionate)



Composition:

Each ml contains:

Imidocarb Dipropionate.....120mg

(As per Innovator's Specifications)

Target Species:

Cattle, Sheep, Horse, Donky, Mules & Dogs.

Indications: Cattle: Treatment and prophylaxis of babesiosis, anaplasmosis and mixed infections.

Dogs: Treatment and prophylaxis of babesiosis.

Dosage and Route of Administration:

Intramuscular or subcutaneous routes.

1. Treatment of babesia (B.divergens, B.bovis, B.bigemina, B.equi, B.caballi, B.ovis, B.canis).

Cattle & Sheep: 1ml/100kg bwt.

Horses, Donkeys, Mules & Dog: 2ml/100kg bwt.

2. Treatment of anaplasmosis and mixed infection due to Anaplasma & Babesia. **Cattle:** 2.5ml/100 kg bwt.

3. Prophylaxis of babesiosis in cattle and horses

Cattle: 2.5ml/100 kg bwt. A single dose will prevent babesiosis for up to 4 weeks depending on the severity of the challenge and species.

Equines: 2ml/100 kg bwt.

A single dose will prevent babesiosis for up to 4 weeks

Withdrawal Period:

Cattle: Meat and offal: 28 days. **Milk:** 3 days.


Dog: Not Applicable.

Instructions:

Store below 25°C. Protect from light and moisture.

Keep out of the reach of children.

To be used as directed by the registered veterinary practitioner only.



ایمی کتیر انجکشن

علامت: ایمی کتیر انجکشن مویشیوں میں بائیزیا سے پیدا ہونے والی بیماریوں جیسے کہ ایٹا پلازموسس کے خلاف مؤثر اثرات رکھتا ہے۔ گھوڑوں، گدھوں، خچروں اور کتوں میں ایٹا پلازموسس اور پی سی سیوس جیسی بیماریوں کے خلاف مؤثر ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال:

ایمی کتیر انجکشن کو جانوروں میں زیر جلد یا گوشت میں لگائیں۔

پی سی سیوس کے علاج کے لئے:

مویشی: 1 ملی لیٹر انجکشن فی 100 کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق استعمال کریں۔

گھوڑے، گدھے، خچروں اور کتے: 2 ملی لیٹر انجکشن فی 100 کلوگرام۔

ایٹا پلازموسس اور مخلوط انفیکشن کے علاج کے لئے:

مویشی: 2.5 ملی لیٹر انجکشن فی 100 کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق استعمال کریں۔

گھوڑے، گدھے اور خچر: 2 ملی لیٹر فی 100 کلوگرام جسمانی وزن۔

نوٹ: ایک خوراک جانوروں میں انفیکشن کا پھیلاؤ 4 ہفتے تک روک سکتی ہے۔

وڈر مال کا عرصہ: مویشی: گوشت اور آفل: 28 دن۔ دودھ: 3 دن۔

کتا: قابل اطلاق نہیں۔

ہدایات: 25 ڈگری سے کم درجہ حرارت پر محفوظ کریں۔ روشنی اور نمی سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ صرف رجسٹرڈ ویٹرنری پریکٹیشنر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے۔

MANUFACTURED BY:
NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.