


تین مفید اور طاقتور دوائیوں کا مرکب



Cephradine

Neomycin

Prednisolone



For the Cure of
Infections & Relief from Pain in
MASTITIS

LACTOVET

IMM INJECTOR

Cephradine+Neomycin+Prednisolone

LACTOVET Hits

MASTITIS

***Much Harder
Than any other IMM***



NAWAN
LABORATORIES (PVT.) LTD.



تین مفید اور طاقتور دوائیوں کا مرکب

LACTOVET

IMM INJECTOR

Cephadrine+Neomycin+Prednisolone

Composition: Each 4 gm contains:
Cephadrine B.P. 300 mg
Neomycin Sulphate B.P. 200 mg
Prednisolone Acetate B.P. 5 mg
(Mfg. Nawan Specs.)

Indications:

- ▶ Lactovet is the first drug of choice for Mastitis.
- ▶ Lactovet in Intramammary form is highly effective to kill localized bacteria rapidly.
- ▶ Lactovet is bactericidal and has anti microbial activity against gram positive and gram-negative organism particularly in local infections coupled with inflammation.
- ▶ Lactovet is active against:
 - ▶ Streptococcus agalactiae,
 - ▶ Streptococcus dysgalactiae,
 - ▶ Penicillin resistant staphylococcus.

Dosage & Administration: Infuse one syringe into each affected quarter teat immediately after milking, at 12 hour intervals.
Clean and disinfect teat before each treatment.

Storage Conditions: Store below 30°C in a dark and dry place away from children.

Withdrawal Period: Milk: 72 Hours, Meat: 8 days.

Packing: 4 gm 12 syringes Box.



Cephadrine

Neomycin

Prednisolone



لیکٹوویٹ آئی۔ایم۔ایم

علامات:

لیکٹوویٹ میڈیٹس کیلئے منتخب کی جانے والی سب سے پہلی دوا ہے۔
لیکٹوویٹ تھنوں کی جملہ جراثیمی بیماریوں، سوزش، سُرخ، درد، سوجن اور گرمی کیلئے بہترین دوا ہے۔
لیکٹوویٹ مختلف جراثیم کش ادویات اور اینٹی الریجک دوا کا مرکب ہے۔

لیکٹوویٹ مندرجہ ذیل صورتوں میں بے انتہا مفید ہے:-

- ▶ تھن میں جراثیمی بیماری
- ▶ تھن کا گرم ہونا
- ▶ دودھ میں پیلاہٹ
- ▶ تھن میں خارش ہونا
- ▶ تھن کا سوج جانا
- ▶ تھن میں درد ہونا
- ▶ دودھ میں خون آنا

MANUFACTURED BY:

NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.

کلیہ: چار گرام میں موجود ہے:-
سیفراڈین: ۳۰۰ ملی گرام، نیومائی سین سلفیٹ: ۲۰۰ ملی گرام،
پریڈنیزولون ایسی ٹیٹ: ۵ ملی گرام
خوراک/طریقہ استعمال:
ایک سرخ متاثرہ تھنوں میں دودھ نکالنے کے فوراً بعد ۱۲ گھنٹے کے وقفے سے۔
دوڑال کا عرصہ: دودھ: ۷۲ گھنٹے، گوشت: ۸ دن
ہدایات: ۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک اور نسبتاً تاریک جگہ پر
بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
پیکنگ: ۴ گرام کی ۱۲ سرنجوں کا بکس