

MARBOWAN

Marbofloxacin (10%) **Injection**

Fast acting/ Ensures Protection



Third Generation
Fluoroquinolone Antibiotic

***Custodian of Healthy Lungs
and Udder***



NAWAN

LABORATORIES (PVT.) LTD.

MARBOWAN

Marbofloxacin (10%) Injection

ماربوفلان انجکشن
(ماربوفلاکساسین)

خوراک اور طریقہ استعمال:

سانس کی بیماریوں میں:

ایک ملی لیٹر بحساب 50 کلوگرام جسمانی وزن ایک ہی انجکشن پٹھوں میں لگائیں اور اگر خوراک 20 ملی لیٹر سے زیادہ بنے تو ایک سے زیادہ جگہوں پر لگائیں۔

شدید ساڑو میں:

ایک ملی لیٹر بحساب 50 کلوگرام جسمانی وزن ایک انجکشن پٹھوں میں یا زیر جلد میں روزانہ تین دن کے لیے۔ پہلا انجکشن اندرون ورید بھی لگایا جاسکتا ہے۔

ہدایات:

۱۔ ماربوفلان انجکشن کو ماربوفلاکساسین سے حساس جانور میں نہ لگائیں۔

۲۔ ہمیشہ گردن والی جگہ پر انجکشن لگائیں۔

۳۔ انجکشن لگنے سے جانور میں ہلکی سی سوزش ہو سکتی ہے۔

◀ **COMPOSITION:** Each ml contains:

Marbofloxacin 100mg
(As per Innovator's Specification)

◀ **INDICATIONS:**

MARBOWAN Injection is indicated for therapeutic treatment of:

- Respiratory infections caused by strains of *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni* and *Mycoplasma bovis* which are sensitive to Marbofloxacin.
- Acute mastitis (caused by *E. coli* strains sensitive to Marbofloxacin).

◀ **DOSAGE & ADMINISTRATION:**

In Cattle/ Buffalo/ Sheep/ Goat:

For treatment of respiratory infections:

The recommended dosage of Marbowan injection is 2mg/kg (1 ml/50 kg b.w.) in a single daily injection by Intramuscular route and If the volume to be injected is more than 20 ml, it should be divided between two or more injection sites.

For treatment of acute mastitis:

The recommended dosage of Marbowan injection is 2mg/kg (1 ml/50 kg b.w.) in a single daily injection by subcutaneous or intramuscular route for 3 consecutive days. The first injection may also be given by intravenous route.

◀ **WITHDRAWAL PERIOD:**


Meat: 6 days **Milk:** 36 hours

◀ **INSTRUCTIONS:**


Do not administer to an animal previously found to be hypersensitive to marbofloxacin.

Store below 30°C in a dry place.

Keep out of the reach of children.



50 ml



MANUFACTURED BY:
NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.