

Metrym-5

(Meloxicam)

Injection

Solution for Injection



Metrym-5

(Meloxicam)

Injection

Solution for Injection



میٹریم - ۵ انجکشن

علامات: سانس کی بیماری میں مناسب اینٹی بائیوٹک کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بیماری کی علامات میں کمی لائے جاسکے۔ ایک ہفتے کی عمر کے بچھڑوں اور دودھ نہ دینے والے مویشیوں میں ڈائریا (اسہال) کے دوران اور رل ری ہائیڈریشن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بیماری کی شدت اور علامات میں کمی آجائے۔ مویشیوں میں مسٹائٹس کے علاج میں اینٹی بائیوٹک تھراپی کے ساتھ معاون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال: گائے، بچھڑے، بھینڑ اور بکریوں: زیر جلد یا وریدی میں۔
0.5mg/kg فی کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق یعنی (1 ملی لیٹر فی 10 کلوگرام) استعمال کریں۔
گھوڑا: وریدی میں 0.6mg فی کلوگرام کے حساب سے استعمال کریں۔
(یعنی 1 ملی لیٹر فی 8 کلوگرام)

کتا اور بلی: زیر جلد یا وریدی میں 0.2mg فی کلوگرام کے حساب سے استعمال کریں۔
(یعنی 0.4 ملی لیٹر فی 10 کلوگرام جسمانی وزن)

ودڈ رال کا عرصہ: مویشی: گوشت: 15 دن - دودھ: 5 دن۔

ہدایات: 25 ڈگری سے کم درجہ حرارت پر محفوظ کریں۔ سورج کی روشنی سے بچائیں۔
منجمد ہونے سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

Composition: Each ml contains: Meloxicam 5mg. (BP Specification)

Target Species: Cattle, Calves, horses, Sheep, Goats, Dogs, cats.

Indications: Cattle Calves, Sheep & Goats:

For use in acute respiratory infection with appropriate antibiotic therapy to reduce clinical signs in cattle. For use in diarrhea in combination with oral re-hydration therapy to reduce clinical signs in calves of over one week of age and young, non-lactating cattle. For adjunctive therapy in the treatment of acute mastitis, in combination with antibiotic therapy. For the relief of post-operative pain following dehorning in calves.

Horses: For use in the alleviation of inflammation and relief of pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders. For the relief of pain associated with equine colic.

Dosage & Route of Administration:

Cattle, Calves, Sheep & Goats: Single subcutaneous or intravenous injection at a dosage of 0.5 mg meloxicam/kg body weight (i.e. 1ml/10 kg body weight) in combination with antibiotic therapy or with oral re-hydration therapy, as appropriate.

Horses: Single intravenous injection at a dosage of 0.6 mg meloxicam/kg body weight (i.e. 1ml/08 kg body weight). For use in the alleviation of inflammation and the relief of pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.

Dogs & Cats: Single subcutaneous or intravenous injection at a dosage of 0.2 mg meloxicam/kg body weight (i.e. 0.4ml/10 kg body weight) in combination with antibiotic therapy or with oral re-hydration therapy, as appropriate.

Withdrawal Period: Cattle: Meat and offal: 15 days. Milk: 5 days.

Instructions: Store below 25°C. Protect from Sunlight. Do not Freeze.

MANUFACTURED BY:
NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.