

Minor Deficiency Leads
To Big Losses



Prevention
is better
than
cure

Multina

Oral Solution

 **NAWAN**
LABORATORIES (PVT.) LTD.

Each Drop Rich In
Multivitamins
& Essential Aminoacids

Multina

Oral Solution

Prevention is better than cure

COMPOSITION: Each ml contains:	D-Pantothenol B.P.	0.6 mg	L-Glycine B.P.	0.4 mg	
Vitamin A B.P.	20,000 .i.u.	Folic Acid B.P.	0.05 mg	L-Histidine B.P.	0.23 mg
Vitamin D-3 B.P.	2,000 .i.u.	Biotin B.P.	0.05 mg	L-Isoleucine B.P.	0.7 mg
Vitamin E B.P.	8 mg	DL Methionine B.P.	10 mg	L-Leucine B.P.	0.95 mg
Vitamin K-3 B.P.	12.2 mg	L-Lysine HCl B.P.	2 mg	L-Phenyl alanine B.P.	0.69 mg
Vitamin C B.P.	10 mg	Choline B.P.	2 mg	L-Proline B.P.	0.41 mg
Vitamin B-1 B.P.	3 mg	L-Alanine B.P.	0.65 mg	L-Serine B.P.	0.75 mg
Vitamin B-2 B.P.	2.4 mg	L-Arginine B.P.	0.63 mg	L-Threonine B.P.	0.48 mg
Vitamin B-6 B.P.	1.2 mg	L-Aspartic Acid B.P.	0.85 mg	L-Tryptophane U.S.P.	0.16 mg
Vitamin B-12 B.P.	15 mcg	L-Cystine B.P.	0.26 mg	L-Tyrosine B.P.	0.45 mg
Nicotinamide B.P.	20 mg	L-Glutamic Acid B.P.	1.52 mg	L-Valine B.P.	0.84 mg

INDICATIONS:

- Prevention and treatment of vitamins deficiencies and stress.
- Improvement of resistance against diseases.
- As an aid in the prevention and treatment of diseases.
- Increased number of fertilized eggs & hatchability.
- For excellent weight gain in Broilers.

STORAGE CONDITIONS:

Sealing tightly after use and store in a dark and dry place, not exceeding 30°C.



ہدایات:

- روشنی اور حرارت سے بچائیں۔
- دوائی ملے ہوئے پانی کو
- چوبیس گھنٹے کے اندر استعمال کریں۔
- تمام دوائی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

DOSAGE & ADMINISTRATION:

Poultry: 1 ml per 5 litres of drinking water.

Cattle: 0.9-1.0 ml per 10 kg b.w.

Note: The medicated drinking water should be used within 24 hours.

- For drinking water administration as per requirement of the animal.

PACKING: 100 ml & 1 Litre

ملٹینا اورل سلوشن

کلیہ: اوپری حصے میں ملاحظہ کریں۔

خوراک: پولٹری: اہلی لیٹرنی پانچ لیٹر پانی میں ملا کر دیں۔

گائے: ۰.۹ تا ۱.۰ ملی لیٹرنی ۱۰ کلوگرام جسمانی وزن

علامات: وٹامن کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ جسمانی نشوونما میں رکاوٹ،

چوزوں میں پیدائشی کمزوری، آنتوں میں سوزش، تولیدی نظام

میں رکاوٹ، عضلات میں کمزوری کیلئے مفید ہے۔

Further information is available upon request:

nl **NAWAN**
LABORATORIES (PVT.) LTD.

Visit us at: www.nawanlab.com
136, Sector 15, Korangi Industrial
Area, Karachi-74900, Pakistan.