

# Potent Weapon Against all Vitamin Deficiencies of Livestock



# Multina

Injection

- Prevents & treats vitamin deficiencies of Livestock diseases, transportation
- Prevents stress caused by vaccination,
- Improves resistance against infections
- Helps Improve fertility & performance in breeding animals

# Multina

## Injection

### Composition:

Each ml contains:

Vitamin A B.P.	15,000 I.U.
Vitamin D <sub>3</sub> B.P.	1,000 I.U.
Vitamin E B.P.	20 mg
Vitamin B <sub>1</sub> B.P.	10 mg
Vitamin B <sub>2</sub> B.P.	5 mg
Vitamin B <sub>6</sub> B.P.	3 mg
Vitamin B <sub>12</sub> B.P.	5 mcg
Nicotinamide B.P.	35 mg
D - Pantothenol B.P.	25 mg

### Indications:

Indicated in the prevention and treatment of vitamin deficiencies in animals, particularly during periods of illness and convalescence. Ends Fatigue, poor start in young animals and travel sickness. Improves resistance against infections & parasitic infections. Mitigates the pain of abortion of breeding animals. Fulfils inadequate vitamin reserves in newborn animals.

### Storage Conditions & Precautions:

Store below 30°C in a dark and dry place away from children. Use the product within 14 days after opening.

### Withdrawal Period:

Animal must not be slaughtered during treatment. Milk is Safe to use during treatment.

خوراک اور طریقہ استعمال:	
گائے اور گھوڑا	۳۰ تا ۲۰ ملی لیٹر
بھیڑ اور بکری	۱۰ تا ۵ ملی لیٹر
لبی اور کتے	۲ تا ۱۵ ملی لیٹر
چھپرے	۱ تا ۵ ملی لیٹر

عصاراتی، زیر جلد اور آہستہ و ریڈی ٹیکہ



### Dosage & Administration:

Cattle and Horse	20 - 30 ml
Sheep and goat	5 - 10 ml
Cat and Dogs	1.5 - 2 ml
Calf	0.5 - 1 ml

Intramuscular, Subcutaneous, and slow Intravenous injection.

### Packing:

50ml & 100ml vials.

## ملٹینا انجکشن

### علامات:

ملٹینا انجکشن جانوروں میں وظامنی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ وظامنی کی کمی سے ہونے والی پیاریوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جانوروں میں موجود جسمانی نشوونما میں رکاوٹ، تولیدی نظام میں رکاوٹ اور عضلات میں کمرور دیکھنے کی نہایت غمید ہے۔ جانوروں کے پچھوں میں جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں انتہائی موثر ہے۔

### دوڑال کا عرصہ:

دورانی علاج جانور کو دفعہ نہ کیا جائے۔ دودھ کے استعمال کی کوئی ممانعت نہیں۔

### احتیاطی تدابیر:

۳۰ گری سے کم درج حرارت پر خشک اور سیستانی تاریک جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رہیں۔ واکل کو کھلنے کے ۱۲ دن کے اندر استعمال کریں۔

### پیکنگ:

۵۰ ملی لیٹر اور ۱۰۰ ملی لیٹر واکل

### کلیے: ایک ملی لیٹر میں موجود ہے:-

وٹامن اے ۱۵,۰۰۰ آئی یو

وٹامن ڈی ۳۰۰۰ آئی یو

وٹامن ای ۲۰ ملی گرام

وٹامن بی ۱۰ ملی گرام

وٹامن بی ۵ ملی گرام

وٹامن بی ۳ ملی گرام

وٹامن بی ۱۲ ۵ مائیکرو گرام

نیکوتین اسید ۳۵ ملی گرام

ڈی - پینتو تھینال ۲۵ ملی گرام

A Complete solution to all vitamin deficiencies of veterinary



MANUFACTURED BY:  
**NAWAN**  
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division  
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,  
Karachi-Pakistan.