


IMM NAPRAVIN INJECTOR

Cefalonium (as dihydrate) (BP)



IMM NAPRAVIN INJECTOR

Composition:

Each 3gm Syringe contains:
Cefalonium as Dihydrate 250mg
(BP Specifications)

Indications for use:

For dry cow therapy to treat existing subclinical infections and to prevent new infections which occur during the dry period caused by the following cefalonium-sensitive organisms: *Corynebacterium bovis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.* and *Arcanobacterium pyogenes*.

Dosage and Administration:

The content of one syringe should be infused into the teat canal of each quarter immediately after the last milking of the lactation. Before infusion, the teat should be thoroughly cleaned and disinfected. Avoid contamination of the nozzle after removing the cap.

Withdrawal Period:

Milk: 96 hours. Meat: Zero days.

Instructions:

Do not use in lactating cow. Store below 30°C in a dark and dry place away from children.

نپراون آئی۔ ایم۔ ایم انجیکٹر

خوراک اور طریقہ استعمال:

ایک سرنج متاثرہ تھن میں دودھ نکالنے کے فوراً بعد استعمال کریں۔
سرنج استعمال کرنے سے پہلے تھنوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔

ودڈرال کا عرصہ: دودھ: ۹۶ گھنٹے۔ گوشت: زیرو دن۔

ہدایات: دودھ پلانے والی گائے میں استعمال نہ کریں۔

۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک اور نسبتاً تاریک جگہ پر
بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

nl NAWAN

LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division

136, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.

