




# **NAWACIN-100** **(PVP)** Injection

**(Oxytetracycline HCl)**



**NAWAN**  
LABORATORIES (PVT) LTD.

# NAWACIN-100 (PVP) Injection (Oxytetracycline HCl)

**COMPOSITION:** Each 100ml contains:  
Oxytetracycline as HCl : 10 gm (USP Specification)

**INDICATIONS:** Nawacin-100 injection is indicated for the treatment of atrophic rhinitis, navel ill, Mastitis, Metritis, Pasteurellosis, infection of respiratory tract and septicemia in cattle, buffaloes, sheep, goats and camels.

This product can also be used in the control of enzootic abortion in sheep.

## DOSAGE & ROUTE OF ADMINISTRATION:

Animal	Body Weight (kg)	24 hourly dosage:	
		Dose (mg/kg)	Volume (ml)
Horse & Camel	500	5	25
Cow & Buffalo	500	3	15
Sheep & Goat	50	8	4

- Through Intramuscular or Subcutaneous

## WITHDRAWAL PERIOD: 24 hourly dosage:

<b>Cattle &amp; Buffalo:</b>		<b>Horses &amp; Camel:</b>
<b>Meat and offal:</b>	35 days	<b>Meat and offal:</b>
<b>Milk:</b>	72 hours	
<b>Sheep &amp; Goat:</b>	53 days	6 months
<b>Meat and offal:</b>	120 hours	

Not authorized for use in horses producing milk for human consumption.

## INSTRUCTIONS:

- Not to be used more than 10 ml in large animals and 5 ml in small animals at one site.
- Transitory side effects like inflammation, pain, salivation, watering, allergic reactions if occurred, will disappear after some time.
- Store below 30°C in a cool, dry place. Protect from light & Heat. Keep out of reach of children

## نوا سین - ۱۰۰ (پی وی پی) انجکشن

خوراک اور طریقہ استعمال:

جانور	جسمانی وزن (کلوگرام)	۲۴ گھنٹہ کی خوراک	
		خوراک (پی ایم/کلوگرام)	حجم (لی لیٹر)
گھوڑا اور اونٹ	۵۰۰	۵	۲۵
گائے اور بھینس	۵۰۰	۳	۱۵
بھیڑ اور بکری	۵۰	۸	۴

- بذریعہ عضلاتی یا زیر جلد انجکشن

ہدایات:

- بڑے جانوروں میں ۱۰ ملی لیٹر سے زیادہ اور چھوٹے جانوروں میں ۵ ملی لیٹر سے زیادہ خوراک ایک جگہ پر نہ لگائیں۔
- انجکشن لگانے کے بعد سوزش، درد، منہ سے پانی کا بہنا اگر نظر آئے تو پریشان نہ ہوں کیونکہ کچھ دیر بعد یہ ساری علامات ختم ہو جائیں گی۔
- دوا کو ۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت رکھیں۔
- دھوپ سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

