

The Fastest Reply to Mastitis

The most common problem in animals globally

**Milk: blood: flakes
or clots, watery**

**Udder: swelling
redness, soreness**

NEOSTREP-PEN

(Strepto-Penicillin)
Injectable Suspension

Effective & potent against

- Mastitis ■ Pneumonia ■ Intra uterine metritis
- Secondary bacterial infections caused by FMD (Foot & Mouth Disease)
- Black quarter disease



NAWAN
LABORATORIES (PVT.) LTD.

NEOSTREP-PEN

(Strepto-Penicillin)

Injectable Suspension



Reasons to choose Neo Strep-Pen



Oil based
injectable
suspension



Easy
Administration
(Better
syringibility)



Homogeneous
mixture
(Pulverized &
Micronized
material used)



Quality
product
with
economical
price

COMPOSITION: Each ml contains: Procaine Penicillin B.P.: 200mg Streptomycin Sulphate B.P.: 160mg

ACTIVE INGREDIENTS: Penicillin are b -lactam thiazolidine derivatives. It inhibits the synthesis of bacterial cell wall. Penicillin prevent the formation of cross linkages between chains. Streptomycin inhibits the protein synthesis at ribosome, bind to ribosomal subunit. This binding result in the blockage of code transfer.

INDICATIONS: Mastitis, Secondary bacterial infections caused by FMD (foot & mouth Disease), Penumonia, Pasteurellosis, Black quarter disease, Strangles. Poultry: C.R.D., Respiratory Disease, E.coli, Salmonellosis etc.

DOSAGE: 1ml per 20kg body weight. Treat during 3 to 5 consecutive days. **Sheep & Goat:** 2.5ml per 50kg body weight. **Cattle & Buffaloes:** 15 ml per 300kg body weight. **Camel:** 30ml per 600kg body weight. Administration: I/M, Subcut. or Intra peritoneal Injections, through 18G needle.

WITHDRAWAL TIME: Meat 30 days Milk: 8 days

WARNING: Shake well before use. Store: Store in a cool place, away from light source.

PACKINGS: 50 ml, 100 ml Vials

نیو اسٹریپ - پین انجکشن

کلیہ: ایک ملی لیٹر میں موجود ہے۔ پروکین پینسلین ۲۰۰ ملی گرام اسٹریپ ٹو مائی سین سلفیٹ ۱۶۰ ملی گرام
علامات: مویشیوں میں نیو اسٹریپ پین تھنوں کی بیماری (Mastitis) ساڑو میں بہت کارآمد ہے۔ اسکے علاوہ خاص طور پر کس انفیکشنز (یعنی گرام مثبت اور گرام منفی) کے علاج کیلئے کارآمد ہے۔
خوراک اور استعمال: ایک ملی لیٹر ۲۰ کلو گرام جسمانی وزن، علاج ۳ تا ۵ دن تک جاری رکھیں۔ بھیڑ اور بکریاں: ۵۰ ملی لیٹر / ۵۰ کلو گرام گائے اور بھینس: ۱۵ ملی لیٹر / ۳۰ کلو گرام اونٹ: ۳۰ ملی لیٹر / ۶۰ کلو گرام • عضلاتی، زیر جلد اور انٹرا پیئریتونیل انجکشن دیا جاتا ہے۔ **دودڑال کا عرصہ:** گوشت: ۳۰ دن دودھ: ۸ دن۔ **احتیاطیں:** دوا کو ۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک اور نسبتاً تاریک جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلائیں۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ **پیکنگ:** ۵۰ ملی لیٹر اور ۱۰۰ ملی لیٹر وائل میں دستیاب ہے۔



MANUFACTURED BY:

NAWAN
LABORATORIES (PVT.) LTD.

136, Sector 15, Korangi Industrial
Area, Karachi-Pakistan.
Tel+ 92 21 35065835-7
Web: www.nawanlab.com