


Metabolic Tonic & Restorative

- Rapidly & completely absorbed from the injection site
- O Bioavailability is 100%
- It reaches the maximum concentration in blood within 20 minutes
- Free from toxic effects of inorganic Phosphorous













Composition: Each ml contains

Description:

Toldimfos Sodium (4-(dimethylamino)-2-methyl phenyl sodium salt) is an organically combined Phosphorus Preparation. Phosphorus is the main constituent of the Bone & Teeth in the body. It is the part of every living cell membrane as Phospholipids. It is also the main constituent of nucleic acid (DNA) and many enzymes. It is the major part of ATP a chemical which body uses to store its energy. It is also needed for the body to make Protein for Growth, Maintenance & other functions

Indication:

TOLDIFON injection is indicated

- Treatment of Metabolic disorders arising around or soon after Parturition due to deficiency of Phosphorous, Calcium and Magnesium.
- Post parturient hemoglobinuria
- Grass tetany/lactation tetany
- Milk fever associated with hypophosphatemia
- As tonic & restorative for the treatment of General debility, weakness & state of exhaustion e.g. after dystocia to restore energy and strength, during convalescence Period to restore quickly from illness
- > Treatment of Pica, Osteophagia & to increase in the weight gain and appetite
- > Treatment of Reduced fertility, delayed maturity, Anestrus in the females & reduced libido in the males
- In Skeletal defects, such as Rickets and Osteomalacia, Lameness, Stiff gate & to promote the callus formation after bone fracture (together with vitamin D)

Dosage & Administration:

For Intramuscular, Intravenous & Subcutaneous injection only General recommended dose for all the Species is 10mg/kg b.w

Cattle, buffalo, Horse: 15-20 ml single dose Calves, Sheep, Goat: 5 ml single dose

Dogs: 1-3 ml single dose

NOTE: In very acute and serious cases where rapid absorption is required the dosage can be given as half by intravenously & half by intramuscular or subcutaneous injection. Multiple injection sites should be used.

Withdrawal Period: Milk & Meat: None

Packing: 50ml vial

Storage: Store below 30°C in a dark & dry place away from children

ٹولڈیم فاس سوڈیم جانداروں کے جسم میں یائے جانے والے فاسفورس کی لیبارٹری میں تیار کردہ دواہ جو کہ جانوروں میں فاسفورس کی کی وجہ ہے ہونے والی بیاریوں کے علاج کیلئے استعمال کی جاتی ہے۔ فاسفورس بڈیوں کا منیادی جزو ہے جم میں ہونے والی تمام تم کی کیمیا کی توڑ پیوڑ میں فاسفورس کا کردار بہت اہم ہے۔ جم میں بننے والی شکر کی توڑ پیوڑ کھیات کی توڑ پیوڑ کرنے میں مددکرتی ہے۔ تمام خلیوں کی حفاظتی جملی کا اہم حصہ ہے اے۔ ٹی۔ پی (ATP) جو کہ جسم کے اندرتوا نافی کو ذخرہ کرتی ہے کا بھی اہم جزو ہے۔ جانوروں کی خوراک میں فاسٹورس کی کمی کی وجہ سے مختلف بیاریاں جانوروں کو لاحق ہوجاتی ہیں۔ جس میں رت موترا، پھوں کا اگر جانا، موتک کا بخاراور کمزوری قابل ذکر ہیں۔ ناوان لیمبارٹریز کا ٹولڈ کیفون انجکشن ان تمام امراض کا علاج کرنے میں مدوفراہم کرتا ہے۔

ٹولڈ یفون انجکشن میں موجود ٹولڈ یم فاس سوڈ یم کا کیمیائی فارمولاجسم میں قدرتی طور پریائے جانے والی فاسفورس کی طرح کا بی ہے اس وجہ سے ٹولڈ یفون انجکشن کا استعال جانوروں ہیں تمامتم کےمفرانرات سے پاک ہے۔

- : *
 - :☆
- تع**عال جانوروں میں تمام سم کے مصرات سے پاک ہے۔** انگشن جانورکے لگتے ہی تیزی سے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور 20 منٹ کے اندرجانورکے جسم میں اپنی بلند سطح پر پنٹی جاتا ہے۔ جانور کے جسم میں قابل استعال شدہ (Bioavailability) انگشن کی مقدار %100 ہے۔ جانور کے جسم کے اندرجائے ہیں ہیں کیائی تو ڈپچوڑ کے ٹمل کو بہتر بنانا شروع کردیتا ہے جس ہے جانور کے جسم کواس کی ضرورت کے مطابق طاقت مانا شروع ہوجاتی ہے۔ جسم میں کیلئیم کی مقدار بڑھانا شروع کردیتا ہے جس سے پٹھوں کا اگر ناقتہ ہونا شارع ہوجاتا ہے اور جانور کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ :\$:32

علامات

:☆

:☆

- ٹولڈ یفون انجکشن کوجانوروں کے جسم میں ہونے والی مندرجہ ذیل بچاریوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ : 🏠
- ر میں ہورا میں ابعد میں فاسفورس اور کیا شیم کی کی وجہ ہے ہوئے والی تیاریوں کے علاج کیلئے جن میں رہ موترا، پٹول کا اکر اور سوتک کا بخار قابل ذکر ہیں۔ عموی طور برایک ٹاک کے طور بر کمزوری اور تھکا وٹ کودور کرنے کیلئے۔
 - جانوروں میں بیجے کی پیدائش کے بعد کمزوری کودور کرنے کیلئے ، بیاری کے بعد جلدی طاقت بحال کرنے کیلئے ۔ :*
 - بحوك اوروزن بردهانے كيلئے۔ :☆
 - بدر يول كى يماريول يس جن بين بديول كالجرجراين، زم جونا، اوربديول كا فيرها بونا قابل و كرب-:*
 - :☆
 - ۔ بیا تورول میں کنگڑ اہٹ کودور کرنے کیلئے۔ بڈی ٹوٹے نے بعداس کے جلدی جڑ جانے کیلئے وٹامن ڈی کے ساتھ استعال کیا جاسکتا ہے۔ :*

خوراك اورطر يقيداستعال

عصلاتی، دریدی اورز برجلدلگانے کیلئے۔

گائے، بھینس، گھوڈا 15-20 ملی کیٹر ایک خوراک ہمیٹر، بکری، پھٹرا 5 ملی کیٹر ایک خوراک ہمیٹرں میں میں میں میں کا خوراک ہمیٹرں کے اعلام میں اور کی کے بعد دوبارہ و ہرائی جائتی ہے جب تک بہتری کے آغار نظر نہیں آجاتے۔ '' پیچیدہ اور مشکل صور تحال میں آدمی خوراک ورید میں دی جائے اور آدمی خوراک کو عندانی یا زیر جلد کیا جائے''۔ پیکنگ: 50 ملی کیٹروائل و دو ڈرال کا عرصہ: گوشت اور دو دھنے کوئی نیں۔ دواکو 306 ہے کم بجوں کی آئی ہے دور رکھیں۔

Tel+ 92 21 35065835-7

احتیاط: وواکوبچول کی تافی ہے دور C 30 کے کم درجہ حرارت برر



136, Sector 15, Korangi Industrial Area, Karachi-Pakistan.

Web: www.nawanlab.com