


- Proven Efficacy
- Excellent Results

*For
Comprehensive
Wound Care*

TOXYMAC Spray



*Oxytetracycline HCl
(3.58% w/w) Aerosol Spray*



NAWAN
LABORATORIES (PVT.) LTD.

TOXYMAC

Spray

Oxytetracycline HCl
(3.58% w/w) Aerosol Spray

Composition:

Each ml of spray contains:-
Oxytetracycline HCl ... 35.8mg
(3.58% w/w)
(As per Innovator's Specification)
Excipient: Gentian Violet ... 0.33% w/w

Description:

Oxytetracycline belongs to Tetracycline group. It is a bacteriostatic drug and inhibit the growth of bacteria by binding reversibly with 30s ribosomal subunit thus prevent the formation of protein. Its spectrum of activity includes aerobic & anaerobic gram positive (Clostridium), aerobic & anaerobic gram negative (Fusobacterium Necrophorum, Bacteroides, Dichelobacter Nodosus) as well as Mycoplasma, Spirochete (Treponema) Rickettsia, Chlamydia & even some Protozoa

Indications: Toxymac Spray is indicated for the treatment of topical infections caused by or associated with organisms sensitive to the action of Oxytetracycline, e.g. Lacerations and abrasions, Prophylaxis of Surgical wounds, after dehorning.

Specific: Treatment of digital dermatitis in cattle and treatment of foot rot and scald in sheep caused by organism sensitive to the action of Oxytetracycline.

Dosage & Directions for use:

For the treatment of foot rot, the hooves should be cleaned prior to administration. Wounds should be cleaned prior to administration. Shake the can before use. Hold the can 15 – 20 cm from the topical area to be treated and administer the spray in bursts of 3-5 seconds duration or until the lesion is adequately covered. Use 2-3 times in a day or as directed by the veterinarian.

Withdrawal Period: Meat & Milk: None

Precautions & Storage:

Keep away from eyes. Avoid contact with skin. Avoid inhaling vapors. Wash hands after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Protect from sunlight. In case of treatment around the eye area, cover eyes in order to prevent contact with the conjunctiva. Do not pierce or burn, even after use. Do not store above 25°C. Keep out of the reach of children.

MANUFACTURED BY:



NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.

Packing: 150ml Aluminium Can.

ٹوکسی میک
اسپرے

کلیہ: ہر ملی لیٹر اسپرے میں موجود ہے۔

آکسی ٹیٹراسائیکلین ہائیڈروکلورائیڈ۔ 35.8 ملی گرام (3.58% w/w)
ایکسپینٹ: جینٹین وائلٹ 0.33% w/w

ٹوکسی میک اسپرے میں موجود آکسی ٹیٹراسائیکلین، ٹیٹراسائیکلین گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ آکسی ٹیٹراسائیکلین جراثیموں کی بڑھوتری کو روکتا ہے۔ آکسی ٹیٹراسائیکلین گرام منفی، گرام مثبت، مائیکو پلازمہ، سپائٹروکٹیس، ریکیشیا، کلے میڈیا اور این ایروبک جراثیم (کلاسٹریڈیم، فیوزوبیکٹیریم، ڈائکلو بیکٹر) کے خلاف کام کرتا ہے۔ **علامات:** ٹوکسی میک اسپرے عمومی طور پر زخموں، جلد کے اوپر انفیکشن، سرجری کے زخم جن کی وجہ آکسی ٹیٹراسائیکلین سے حساس جراثیم ہوں ان کے علاج کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر گائے کے کھروں کے زخم اور بھیڑ کے کھروں کے زخم جن کی وجہ آکسی ٹیٹراسائیکلین سے حساس جراثیم ہوں ان کے بیرونی طور پر علاج کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ **خوراک اور استعمال**

کرنے کا طریقہ: ٹوکسی میک اسپرے کو استعمال کرنے سے پہلے زخم کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ خاص طور پر کھروں کے زخموں پر استعمال کرنے سے پہلے کھروں پر لگے مٹی اور گوبر کو اچھی طرح صاف کر دیں۔ استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں۔ ٹوکسی میک اسپرے کی بوتل کو زخم سے 15-20cm کے فاصلے پر رکھ کر 3-5 سیکنڈ تک اسپرے کریں۔ یا تب تک اسپرے کریں جب تک سارا زخم کے اوپر اسپرے نہ ہو جائے۔

دودھ وال کا عرصہ: گوشت اور دودھ: کوئی نہیں

احتیاط اور ہدایات: جانوروں کی آنکھوں سے

دور رکھیں۔ اسپرے کو شعلے کے قریب مت

رکھیں۔ منہ میں اسپرے نہ کریں۔

دوا کو نمی اور روشنی سے محفوظ رکھیں۔

خالی کنٹینر کو مت جلائیں۔

۲۵ ڈگری سے کم درجہ حرارت

پر رکھیں۔ بچوں کی پہنچ سے

دور رکھیں۔

پیکنگ: ۱۵۰ ملی لیٹر

ایلو مینیم کین