

Trimodin

(Trimethoprim & Sulphadiazine)

Bolus



Trimodin
(Trimethoprim & Bolus
Sulphadiazine)

Target Species: Cattle, Calves Sheep & Horse.

Indications: For the treatment of calves, foals, lambs suffering from bacterial infectious diseases (urinary and genital, respiratory, digestive organs, secondary bacterial diseases after viral diseases, post-traumatic and postoperative infectious diseases).

Dosage & Route of Administration: The crushed tablet should be mixed with a small amount of water, milk or milk replacer, or feed. Calves, foals, sheep should be given 1 tablet per 15 kg body weight once daily, once or divided into two doses every 12 hours. Treatment is continued until clinical signs of the disease disappear and for an additional two days.

Withdrawal Period: Meat: 15 days. Horse: Not Applicable.

Instructions: Store below 25°C. Store in a dry place. Protect from light and moisture. Keep out of the reach of children. To be used as directed by the registered veterinary practitioner only.

ٹرائی موڈین بولس

علامات: بچھڑے، میمنے اور نوعمر گھوڑے میں بیکٹیریل انفیکشنز سے پیدا ہونے والی بیاریوں کے علاج کے لئے مؤثر ہے جیسے کہ۔ ﴿ نظام اخراج کے بیکٹیریل انفیکشنز ۔ ﴿ نظام انہضام سے متعلق بیکٹیریل انفیکشنز ۔ ﴿ نظام تنفس کے بیکٹیریل انفیکشنز ۔ ﴿ وائر ل بیاریوں کے بعد پیدا ہونے والے ثانوی بیکٹیریل انفیکشنز ۔ ﴿ چوٹ بیازخم کے بعد لاحق ہونے والے بیکٹیریل انفیکشنز ۔

خوراک اورطریقۂ استعال: مجھڑے،میمنے اورنوعمر گھوڑے میں ایک گولی فی 15 کلوگرام وزن کے مطابق استعال کریں۔گولی کواچھی طرح پاؤڈر کی شکل میں تبدیل کریں اور پانی ، دودھ یا دودھ کے متبادل فیڈ کے ساتھ اچھی طرح حل کر کے محلول کی شکل میں بنا کر استعمال کریں۔

> ودڈرال کاعرصہ: گوشت - 15 دن۔ گھوڑ ہے: قابل اطلاق نہیں۔

ہدایات: 25 ڈگری سے کم درجہ کرارت پر محفوظ کریں۔ خشک جگه پر محفوظ کریں۔ روشنی اور نمی سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ صرف رجسٹر ڈویٹرنری بریکٹیشنر کی ہدایت کے مطابق استعال کیا جائے۔





Animal Health Division 136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,

Karachi-Pakistan.