

*A Tested  
**Combination***



***TYLOMYCIN-F***

P O W D E R

**plus**

Tylosin 6% Erythromycin 4% Furaltadone 15%

***With Power To Penetrate  
Where Many Cannot***

 **NAWAN**  
LABORATORIES (PVT.) LTD.

Guarantee of your flocks health.

# TYLOMYCIN-F

P O W D E R **plus**

with strong microbial activity

- Easy dose administration of 1 gm per 2 litre of water.
- Strong synergistic action.
- Least side-effects.
- Most economical treatment for costly diseases.

**Composition:** Each kg powder contains:

Tylosin tartrate B.P. 60 gm,  
Erythromycin thiocyanate BP 40 gm,  
Furaltadone HCl E.P. 150 gm.

**Indications:** For the Prophylaxis and treatment of Mycoplasmosis, C.R.D., Mycoplasmal synovitis, Coryza, pneumonia, Vibrionic hepatitis, Streptococcus, Staphylococcosis, Chlamydiosis & secondary bacterial invasions.

**Dosage: Preventive:** 1 gm / 2 litres of water for 3-5 days or 100 gm per 50 kg feed bag.

**Curative:** 1 gm / litre of water for 3-5 days or 200 gm per 50 kg feed bag.

**Packing:** 250 gm, 500 gm, 1 kg Jar.



مرغیوں میں گرام منفی اور گرام مثبت جراثیم  
کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے علاج کیلئے۔

## ٹائیلومائی سین۔ ایف پلس پاؤڈر

**کلیہ:** ایک کلوگرام پاؤڈر میں موجود ہے۔ ٹائیلوسین ٹارٹریٹ: ۶۰ گرام، اریٹرومائیسیٹن تھائیوسیائیڈ: ۴۰ گرام، فیورالٹاڈون: ۱۵۰ گرام  
ٹائیلومائی سین۔ ایف۔ پلس اپنے مخصوص دائرہ کار کی وجہ سے مرغیوں میں سانس، سینے، تنفس اور پھیپھڑوں کی پیچیدہ بیماریوں، نزلہ،  
زکام، آنکھوں ناک سے پانی بہنا، بیکٹیریائی نمونیا جیسے مہلک امراض کے علاوہ ای کولائی انفیکشن، ہیضہ، ٹائیفائیڈ، گل گھوٹو، آنتوں کی  
سوزش اور خونی پیش میں کارگر ہے۔ **مقدار خوراک:** تحفظی مقدار: ایک گرام ۲ لیٹر پانی میں ۳-۵ دن تک یا ۱۰۰ گرام ۵۰ کلوگرام فیڈ بیگ  
میں دیتے۔ **معالجاتی مقدار:** ایک گرام ایک لیٹر پانی میں ۳-۵ دن تک یا ۲۰۰ گرام ۵۰ کلوگرام فیڈ بیگ میں دیتے۔

Further information is available upon request:

 **NAWAN**  
LABORATORIES (PVT) LTD.

Visit us at: [www.nawanlab.com](http://www.nawanlab.com)  
136, Sector 15, Korangi Industrial  
Area, Karachi-74900, Pakistan.