



VALONE

INJECTION
(Buparvaquone)



**"Valone Inj:
Defying Theileriosis, a Lifesaving Shield
Against a Lethal Threat."**



VALONE

INJECTION

(Buparvaquone)

ویلون انجکشن

علامات:

COMPOSITION:

Each ml Contains:
Buparvaquone.....50mg

INDICATION:

VALONE Injection is indicated for the Treatment of Bovine Theileriosis, caused by different types of Theileria:

T. Parva
T. Annulate
T. Orientalis

MODE OF ACTION:

Valone directly inhibits the respiration of Theileria parasites.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Administration the following dose by deep intramuscular IM Injection.
Bovines: 1ml per 20kg body weight.
In severe cases 2nd dose is required after 48 – 72 hours.
Do not administer more than 10ml in one side.

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat: 42 days Milk: 2 days

PACKING: 20ML

FURTHER INFORMATION:

Valone Injection Benefits:

1. Is acting fast (reach blood serum activity 3 h after injection)
2. Active against Schizont & Piroplasm
3. Effective during incubation period
4. Full return to productivity
5. Economical choice

INSTRUCTION:

- Store below 30°C in a dark and dry place.
- Protect from heat and light.
- Keep medicine out of the reach of children.

ویلون انجکشن مویشیوں میں تھیلیریوسس کے مرض کا موثر علاج ہے۔ تھیلیریوسس ایک جان لیوا مرض ہے۔ یہ مرض خون کے طفیلی کرم تھیلیریا سے پھیلتا ہے۔ یہ کرم جانور کے غدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوزش کی وجہ سے غدود کا سائز بڑھ جاتا ہے اور جانور کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔

خوراک اور طریقہ استعمال:

عضلاتی انجکشن۔

عمومی خوراک اہلی لیٹر/۲۰ کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق۔

انجکشن گردن اور پٹھوں میں لگائیں۔

ضرورت پڑنے پر ۲۸ سے ۷۲ گھنٹے بعد دوبارہ لگائیں۔

ایک جگہ پر اہلی لیٹر سے زیادہ نہ لگائیں۔

دو ڈرال کا عرصہ:

گوشت: ۴۲ دن۔ دودھ: ۲ دن۔

ہدایات:

۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک نسبتاً تاریک جگہ پر

بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

VET

