


WELNOX

Solution For Injection

DL-Acetylmethionine, Cyanocobalamin,
L-Carnitine Hydrochloride, Alpha-Tocopherol Acetate.



 **NAWAN**
LABORATORIES (PVT) LTD.



Vit E

B₁₂

DL-Acetyl-
methionine

L-Carnitine

ویلنوکس انجکشن

Composition: Each ml contains:
DL-Acetylmethionine 200 mg
L-Carnitine hydrochloride 61.3mg
eq. to L-Carnitine 50mg
Alpha-tocopherol acetate 32.9mg
eq. to alpha-tocopherol 30mg
Cyanocobalamin 0.2 mg
(Innovator's Specification)

Target Species: Cattle, Sheep & Horse.

Indications: Welnox Injection is indicated in cattle, horses and sheep for nutritional support and is to be administered as an adjunct to standard therapy in animals suffering from toxic and metabolic disorders, in conditions of reduced hepatic functionality, in animals facing heavy and protracted physical stimulus and for the transition cow or for pregnant ewes, and mares.

- Alterations in milk quality or quantity
- Anorexia, dysorexia
- Convalescence, postoperative course
- Dietary imbalance and deficiencies
- Poor performance
- Physical fatigue and debilitation
- Stress management

Dosage and Route of Administration:

For intramuscular use.

Cattle, Horses: 5 ml/100kg Body weight.

Calves, Sheep, Foals: 0.5-1 ml/10 kg Body weight.

Administer once daily for at least 3-5 days.

Withdrawal Period: Cattle, Sheep: Meat and offal: Zero days.

Milk: Zero hours. **Horse:** Not Applicable

Instruction:

Store below 25°C. Protect from light and moisture. Keep out of the reach of children. To be used as directed by the registered veterinary practitioner only.

علامات: ویلنوکس انجکشن مویشیوں، گھوڑوں اور بھیتروں میں غذائی معاونت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ معیاری علاج کے ساتھ بطور اضافی علاج ان جانوروں میں دیا جاتا ہے جو زہریلے یا مینا بولک امراض میں مبتلا ہوں، جگر کی کارکردگی میں کمی کا شکار ہوں، شدید یا طویل جسمانی دباؤ کا سامنا کر رہے ہوں، یا دودھ دینے والے، حاملہ بھیتروں یا گھوڑیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دودھ کی کوالٹی کو بہتر بنانے کیلئے۔ غذائیت کی کمی دور کرنے کیلئے۔ آپریشن کے بعد کا کورس۔ ناقص کارکردگی۔ جسمانی تھکاوٹ۔

خوراک اور طریقہ استعمال: بذریعہ عضلاتی۔


مویشی، گھوڑے: 5 ملی لیٹر/100 کلوگرام جسمانی وزن۔

بچھڑے، بھیتروں: 0.5-1.0 ملی لیٹر/10 کلوگرام جسمانی وزن۔

کم از کم 3-5 دن تک روزانہ ایک بار استعمال کریں۔

وڈرال کا عرصہ: گوشت اور آفل: صفر دن۔ دودھ: صفر گھنٹہ۔

ہدایات: 25 ڈگری سے کم درجہ حرارت پر محفوظ کریں۔ روشنی اور نمی سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ صرف رجسٹرڈ ویٹرنری پریکٹیشنر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے۔



MANUFACTURED BY:
NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.