

wormec

DRENCH

(Ivermectin)

For the treatment and control of
internal & external parasites and nasal bot of
Cattle, Sheep and Goats.

کا

ورمک ڈرنچ

طاقتور فارمولا



علامت: بھیڑوں اور بکریوں میں معدہ اور پھیپھڑوں کے راؤنڈ ورم اور ناک میں پائے جانے والے لاروا اور کیڑوں کے انفیکشن کے علاج اور کٹروں کے لیے مؤثر ہے۔
بھیڑوں میں درج ذیل کیڑوں کے خلاف مؤثر ہے: ہیموکس، ٹیلاڈورجیا (آسٹریجیا)، ٹرائیکوسٹرونجائیلیس، کوپیریا، نیماٹوڈائرس، سٹرونجائلائڈیز، کبیرشیا، ٹرائیکولوس، ایسوفیگوسٹوم، بیگرایا، ڈکٹیولوس اقسام، اور ایسٹرس اوس (ناک کے بوٹ)۔
بکریوں میں درج ذیل کیڑوں کے خلاف مؤثر ہے
ہیموکس، ٹیلاڈورجیا، ٹرائیکوسٹرونجائیلیس، نیماٹوڈائرس، سٹرونجائلائڈیز، کبیرشیا، ایسوفیگوسٹوم اور ڈکٹیولوس اقسام۔

Composition: Each Liter Contains: Ivermectin 0.880gm (USP Specification)

Target Species: Sheep and Goats.

Indications: For the treatment and control of gastrointestinal and pulmonary nematodes and nasal bot infestations in sheep and goats.

Sheep: Effective against Haemonchus, Teladorsagia (Ostertagia), Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Strongyloides, Chabertia, Trichuris, Oesophagostomum, Gaigeria, and Dictyocaulus spp., as well as Oestrus ovis (nasal bots).

Goats: Effective against Haemonchus, Teladorsagia, Trichostrongylus, Nematodirus, Strongyloides, Chabertia, Oesophagostomum, and Dictyocaulus spp.

Dosage and Route of Administration: Route: Oral. Dosage: 0.2 mg of ivermectin/kg body weight (equivalent to 2.5 ml/10 kg body weight). To ensure correct dosing, body weight should be determined as accurately as possible, and the accuracy of the dosing device should be checked. If animals are to be treated collectively, they should be grouped by body weight, and dosing should be based on those weights to avoid both underdosing and overdosing.

Withdrawal Period:

Sheep: Meat: 6 days. **Goats:** Meat: 8 days.
Milk: Use is not authorized in animals whose milk is intended for human consumption. Do not use in pregnant animals whose milk will be used for human consumption within 60 days of the expected date of parturition.

Instructions:

Store below 25°C. Store in a dry place.
Protect from light and moisture. Keep out of the reach of children. To be used as directed by the registered veterinary practitioner only.

خوراک اور طریقہ استعمال: دو کو بلور ڈرنچ ڈوزنگ گن یا ڈرنچ بوتل کے ذریعے پلائیں۔
خوراک: 2.5 ملی لیٹر فی 10 کلوگرام جسمانی وزن۔ جانور کو وزن کے مطابق درست مقدار میں خوراک دیں۔ اگر جانور زیادہ تعداد میں ہوں تو انہیں وزن کے لحاظ سے گروپ بنا کر متعین خوراک دیں تاکہ مقدار کی کمی یا زیادتی سے بچا جاسکے۔

ودڈرال کا عرصہ: بھیڑیں: گوشت: 6 دن۔ بکریاں: گوشت: 8 دن۔

دودھ دینے والے جانوروں میں استعمال کی اجازت نہیں۔

حاملہ جانوروں میں متوقع ولادت سے 60 دن قبل استعمال نہ کریں۔

ہدایت: 25 ڈگری سے کم درجہ حرارت پر محفوظ کریں۔ خشک اور ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔

براہ راست روشنی اور نمی سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

صرف رجسٹرڈ ویٹرنری معالج کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں



MANUFACTURED BY:

nl

NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division

136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.