

wormec

INJECTION
(Ivermectin 1%)

***An Effective &
Protected Formulation***

Wormec

INJECTION
(Ivermectin 1%)

ورمک انجکشن

Composition: Each 100ml contains:

Ivermectin 1gm

(USP Specification)

Indications: Treatment of gastrointestinal roundworms and lungworm infections, lice, oestriasis and scabies in buffaloes, cattle, goats, sheep and camel.

Dosage & Route of Administration:

Cattle, Buffaloes, Sheep, Goats &

Camels: 1ml for 50kg (0.2 mg /kg) body weight through subcutaneous injection only.

Not for IV/IM.

Withdrawal Period:

Cattle: Meat and offal: 49 days. Do not use in lactating cows producing milk for human consumption. **Sheep: Meat and offal:** 42 days. Do not use in lactating ewes producing milk for human consumption.

Instructions:

- Wormec is highly photo- sensitive product.
- Administer under shade saving animal and Inj. from sunrays.
- Store below 30°C. Protect from heat, light & children.

خوراک اور طریقہ استعمال:

گائے، بھینس، بکری اور اونٹ:

املی لیٹر برائے ۵۰ کلوگرام (۰.۲ ملی گرام/کلوگرام)

جسمانی وزن بذریعہ زیرجلد۔

عضلاتی اور ویدی استعمال ممنوع ہے۔

ودڈرال کا عرصہ: مویشی: گوشت اور آفل:

۴۹ دن۔ دودھ پلانے والی گایوں میں استعمال نہ کریں

جوانسانی استعمال کے لیے دودھ پیدا کرتی ہیں۔

بھیڑ: گوشت اور آفل: ۴۲ دن۔

دودھ پلانے والی بھیتروں میں استعمال نہ کریں

کو جوانسانی استعمال کے لیے دودھ پیدا کرتی ہیں۔

ہدایات:

• سورج کی شعاعوں اور تیز دھوپ سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔

• ٹیکہ لگاتے وقت جانور کا سائے میں ہونا ضروری ہے۔

صرف زیرجلد انجکشن دیجئے

• دوا کو ۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت رکھیں۔

دھوپ سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔



NAWAN
LABORATORIES (PVT) LTD.

NAWAN LABORATORIES (PVT) LTD.,
Animal Health Division
136, Sector 15, Korangi Industrial Area,
Karachi-Pakistan.