

Injection



"Ivermectin and Clorsulon – A Synergistic Duo for Total Control."



Injection Ivermectin, Clorsulon

Composition:

Each ml contains Ivermectin 10mg/ml Clorsulon 100mg/ml

Introduction:

Wormec Super Injection is a highly effective combination injection that targets both internal parasites and liver fluke in livestock. It contains Ivermectin and Clorsulon. It is ideal for treating mixed infestations in cattle. This solution is providing broad-spectrum activity against gastrointestinal worms, lungworms, lice, mites, and liver flukes.

Indications:

ور مک سیر انجکشن کا ایک د فعہ استعال ہی تمام اندر و نی اور ببر و نی کرموں کے ساتھ Gastrointestinal Roundworms: Treats both adult and larval لیور فلوک کامکمل خاتمه کرکے جانوروں کوصحت مند اور توانا بنانا ہے۔ stages of parasites such as Ostertagia ostertagi, ور مک سیرا نجکشن اندرونی طور یرخون چوسنے والے لیور فلوک اور میرونی طور پر Haemonchus placei, Cooperia spp., and Trichostrongylus spp Lungworms: Effective against Dictyocaulus viviparus خون یعنے والی جوؤں اور چیڑوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ (adult and larval stages).

Liver Fluke: Targets adult Fasciola hepatica.

Eve Worms: Eliminates adult Thelazia spp.

Mites and Lice: Effective against Psoroptes bovis, Sarcoptes scablei, sucking lice, and aids in the treatment of biting lice (Damalinia bovis).

ورمك سير انجكشن

کی پیدوار کے ساتھ ساتھ متعد بھاریوں کا باعث بنتے ہیں۔

لیورفلوک، تمام اندرونی اور بیرونی کرم جانوروں میں کمزوری گوشت اور دودھ

طريقهاستعال:

1 ملی لٹر انجکشن 50 کلو گرام جسمانی وزن کے مطابق زیر جلد (گائے ، تینسیں ، بھڑ ، بکری)

Dosage and Administration:

Dosage: Administer 1 ml per 50 kg body weight of cattle, buffalo, sheep, and goats subcutaneously (equivalent to 200µg Ivermectin and 2mg Clorsulon per kg bodyweight).

Precautions:

Do not administer intravenously or intramuscularly. Take care to prevent self-injection as it may cause local irritation. The product is highly toxic to aquatic organisms; avoid contamination of water bodies.

Withdrawal Time:

Meat and offal 66 Days.



