


# ZOSTER

•• (Triclabendazole & Oxfendazole)  
**Oral Suspension**

**Zoster Oral Suspension Shielding  
Livestock, Enhancing Production**



# ZOSTER

(Triclabendazole & Oxfendazole)

Oral Suspension

## Composition:

Each ml Contains:

Triclabendazole .....85 mg

Oxfendazole .....22.65 mg

(As per Innovator's Specifications)

## Target Species:

Camel, Cattle, Sheep & Goat.

## Indications:

Zoster Oral Suspension is a broad spectrum anthelmintic for the treatment and control of mature and developing immature gastro-intestinal roundworms and lungworms and also tapeworms in cattle and sheep, for the treatment and control of adult, immature and early immature stages of liver fluke (*Fasciola hepatica*) susceptible to triclabendazole.

## Dosage & Route of Administration:

For oral administration only.

Camels, Cattle, Sheep & Goats: 1ml per 8 kg Body weight.  
For correct dosage, body weight should be determined as accurately as possible; the accuracy of the dosing aid should be checked.

## Withdrawal Period:

Meat: 31 days.

## Instructions:

Store below 25°C. Protect from light.

Do not freeze. Keep out of reach of children.

## زوسٹر اورل سسپنشن

### علامات:

زوسٹر اورل سسپنشن بالغ اور نابالغ معدہ اور آنتوں کے گول کرم اور پھیپڑوں کے کرم، ٹیپا، فیتا نما کرم اور جگر کے کرم (*Fasciola hepatica*) کے علاج اور کنٹرول کے لئے ایک وسیع الاثر Anthelmintics ہے۔

### خوراک اور طریقہ استعمال:

بذریعہ اورل۔ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور اونٹ۔  
اصلی لیٹر فی ۸ کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے استعمال کریں۔

### وڈ ڈرال کا عرصہ:

گوشت: ۳۱ دن۔

### ہدایات:

۲۵ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر محفوظ کریں۔  
روشنی سے بچائیں۔ ٹھنڈ نہ کریں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔



MANUFACTURED BY:  
**NAWAN**  
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division

136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,  
Karachi-Pakistan.